

PUBBLICAZIONE ANNUALE

AGENDA
1903

OMAGGIO
ai Signori Medici Italiani

Compagnie Fermière
DE VICHY

24, Boulevard des Capucines - Paris.

Dott. Enrico Lussel e C.
Successori di C. Paneraj

(Italia)

LIVORNO

Per tutto quanto ha relazione coll'AGENDA
rivolgersi a F. CASTELLI, Ispettore della Compagnia di Vichy

13, Rue de Bruxelles - PARIGI.

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ANTICOL”

1° Giovedì CIRC. DEL SIG. GENNAIO S. DEFENDENTE Venerdì 2

Apfe

- I. Sp. della tintura di mirra e di zedaira à gr. dieci
I. pennellature
- II. sul salicilato di soda gram. cinque
acqua distillata gram. venticinque
I. pennellature
- III. acido salicilico pestigram. quindici
acqua distillata gram. cento
I. pennellature
- IV. borato sodico e glicerina à gr. gram. due
miel bianco gram. dodici
I. toccare 4 apfe più volte al giorno
- V. borato sodico gram. quattro
tintura di mirra gram. otto
sirop. di moro gram. sessanta
pennellature

I

doente ingombrato (bubbone)
Quando è suppurato si scosta con cura di
linga dalla periferia, previamente toccata
con tintura di iodo, con un grosso ago e molto
lenta mente ed il più completamente possibile
se il bubbone è molto grasso si lava la cavità
con siero fisiologico tiepido, e dopo aspirato
questo siero si inietta una 2 o 5 cc. di carne
colloidale, e ciò per ogni giorno, ma se la
secrezione purulenta è molto abbondante
si praticano le iniezioni due volte al giorno

Malattie dello
Stomaco e degli Intestini

VICHY-HOPITAL

3 Sabato S. GENOVEFFA M. GENNAIO S. TITO V. Domenica 4

Acidità

I Salicinato di bismuto, magnesio inglese
& bicarbonato di soda aa gram. cinque
m. f. e. N.° Quindici
d. una prima di ciascuna parte in acqua

II magnesia bisulata flu.
d. mezzo cucchiaino in caffè in gram. 30 d
acqua dopo i pasti

autointossicazione intestinale probabile
I (a) metarsato pot. n.° 10
iniettori ipodermici
(b) per ogni quattro ore tre capsule
di laktogenina e iddeofornis
(c) prima d'ora di sera una compressa
di lacteol del Dr. Franckard
mattina e sera latte nel giorno bradi lenti

anestesia generale chirurgica
I finale Dr. M.A.S.S. Zambonetti
d'iniezioni intramuscolari
adiposi

I bicarbonato di soda gr. venti
carbonato di litina effervescente gr. Dieci
carbonato neutro di potassa gr. cinque
m. f. e. N.° Venti: mattina e sera una a digiuno
per vitto carne magra, latte spannato, bianco di uovo
lingua passibile, ginnastica, suole: Proteropia

PASTIGLIE PANERAJ

IL MIGLIOR RIMEDIO
CONTRO
LA TOSSE

5 Lunedì

S. AMALIA

GENNAIO

EPIFANIA

Martedì 6

Amigdalite

Ipp. del borato sodio e salicilato sodio in gran. quattro
miele bianco gram. venti

Decotto di orzo gram. Duecento

1 gargarismi ogni tre ore, e due volte al giorno
pennellate con glicerina gram. quaranta

clorato idrato gram. quattro

acido fenico gram. uno

II

Glicerina gram. Dieci

benzocaina centigr. settantacinque

1 pennellate due volte al giorno

III

glicerina gr. cinque

liquore di iodo gr. otto

1 gargarismi mattina e sera

amenorrea e dismenorrea e contrazione
nella mancanza della mestruazione o nella
mestruazione profusa e dolorosa.

ovarial flac.

da 40 a 30 giorni al giorno e per 20 o 25

mesi si vi è anemia si associa il ferro

il tiroidal ed inserzioni di gliceresofati

Per impedire le FRODI

e le sostituzioni bisogna aggiungere sulle ricette alla parola VICHY il nome della Sorgente.

7 Mercoledì S. GIULIANO GENNAIO S. LUCIANO Giovedì 8

Arteriosclerosi

I

Thyroidina fl. 4

1. seconda istruzione a stampa

si prepara presso l'Istituto neuroterapico Italiano - Via S. Stefano n. 30 Bologna

II

Asclerosina "Sofos" fl. 4

1. due cucchiaini al giorno con i pasti

Albuminuria

1. atteso di strenzio gram dieci

si riprova si orchie di arancio amaro gr. v. rd.

acqua distillata gram sessanta

1. un cucchiaino 3 o 4 serti mattina e sera

Alopecia

Tintura di capsico e di cancheridi a g. quindici

u di china gr. dieci

acido salicilico gr. uno

alcol etilico gr. cento

acqua distillata gr. centocinquanta

us. per frizione

1. trofizzazione sulle chiazze depilate con spugna o bollito di cotone prima tre volte al giorno e quindi due volte.

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

9 Venerdì s. GIUSTINO GENNAIO s. GUGLIELMO Sabato 10

Angina pectoris

Sp. Sol. liquore di Hoffman, Sierbura, ebera
di valeriana, di digitale e di belladonna in gr. cinque
1. da dieci a venti giorni nell'aceto.

Angina casarrate

1 Sp. Sol. salicilato di soda gram. cinque
acqua distillata gram. cento
d. una cucchiain. da sinistra in un bic-
chiere di acqua molto calda per gargaris-
sini sei a otto volte al giorno.
N.B. È più comodo usare le cartine per prepa-
rare l'acqua volta per volta per un giorno
perché le soluzioni sono instabili.
Si usi lo stesso trattamento nella otom-
lide aftosa come per disinfettare la bocca
ed il naso nel morillo in atto e nella con-
natescenza.

H Lavaggio della gola con acqua di Sette

1. Ad un comune sifone di setta si adatta
un tubo di gomma sufficientemente lungo
per aver libere le due mani. Con 5 o 6 col-
pi di sifone di pochi secondi ciascuno si
pratichi un buono lavaggio della gola, si
ripeta almeno sei volte al giorno.
Atto medicatura utile per qualunque angina.

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

11 Domenica S. ORTENSIA GENNAIO S. MODESTO Lunedì 12

accessi di fissazione nelle malattie infettive
(febbre puerperale, difterite, pneumonico,
e nelle forme gravi di altre infezioni)
Si escludono le nefriti, le cardiopatie
e la diatesi.

L'ascesso si produce nelle seguenti regioni
deltoidea - epigastrica (a media distanza
tra la spina iliaca e la parte costale)
nella parte esterna della coscia - nella
natica - nella massa lombare.

Terapia

L'iniezione si fa con una siringa di 5 cc. di
essenza di terebentina e se con la
prima iniezione non sarà prodotta
la reazione si potrà ripetere una
seconda dopo 12 o 24 ore e così
si potranno fare tre o quattro
puncture per i bambini non più
di un quarto di siringa.

dieta e necrotica

Nei individui ben nutriti si prescrive
l'uso del pane e per ogni sera si ap-
plica la seguente pomata, tagliando il
materiale con incisione.

In 200 mg. precipitato, resorcina e zinco a g. uno
lanolina e vaselina a g. quindici
m. e se vi è uno stato subacuto si usano su
si affungerà olio di cade q. d. dieci e la lano-
lina e la vaselina si prende a g. dieci ciascuna.

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA TOSSE

13 Martedì B. VERONICA GENNAIO S. DAZIO ARC. Mercoledì 14

Amnesia e avaria pericran

I.° Exepin Zambetti = 6 cucchiaini la sera al giorno.
In un paio di brado freddo o tiepido venti a quaranta grammi ossia due a quattro cucchiaini di midollo di ossa raso e fresco di vitello.

II. Gatte piate di arsenico di ferro di I e II grado n.° 24.
" " di essero iodato di I e II grado n.° 24.
Le inserzioni sotto regione glutea una al giorno otto.

III. a) Pillole di Bland n.° seicento

Bakanol per la 1.ª settimana una al mattino ed una la sera.
una serie 2.ª mattina, mezzogiorno e sera una di inserzioni.
3.ª due al mattino e due la sera.
dieci piate, se 4.ª due al mattino, due a mezzogiorno e due la sera.
spensione di 5.ª quattro al mattino e quattro la sera.
7 giorni oltre 6.ª tre al mattino tre a mezzogiorno e tre la sera.
serie e super 7.ª quattro al mattino, quattro a mezzogiorno e quattro la sera e 3 serie e così di combinarsi con dolci per giorni.

(b) idroterapia o con la doccia o col bagnato efficacissima i rici di montagna nella pisse.

Dipendente da malaria per dieci giorni inserzioni di cacodilato sodico con stricnina per dieci inserzioni protoferrina e guardarsi ripelle di diurno, il cacodilato e la protoferrina. bagno a doccia ogni 10 da massaggi ogni mattina.

Del citrato di ferro verde gram. otto
cacodilato di soda gram. uno e centig. ses. asta
I.° 2.° clorato di cocaina gram. uno e centig. venti
aq. distillata e sterilizzata gram. centoventi
inserzioni in paranasalari

10 Centesimi il pacco per un litro d'acqua

SALE VICHY-ÉTAT

15 Giovedì

S. MAURIZIO

GENNAIO

S. MARCELLO

Venerdì 16

I

istisolo
 go. uno
 oss. So di zinco
 e potteriziale di
 bis. nuto
 aa. go. sei
 vaselina
 go. d'acqua
 uso spuma

II

assorbente e cicatrizzante
 (piaghe - ferite - seni fistolosi)
 La segatura di legno duro torrefatta agitando continuamente durante la torrefazione e passata ad uno staccio fino.
 In segatura così trattata si immerge sopra la piaga i seni fistolosi si riempiono, e trattandosi di gomme asce suppurate si aggiungerà per ogni dieci grammi di segatura gram. uno di iodofornio.
 a meglio

Unguento cicatrizzante Rannuti
 Si stenda su tela di lino per quanto è estesa la piaga, e si applichi dopo aver lavata la parte lesa con decozione di china: se vi è molto pus, si toglie l'impiastrino tre volte al giorno, si deterge del pus aderente allo stesso, si rimiscola un po' e si riapplica, rinnovandolo solo se si sarà consumato, oppure ogni tre o quattro giorni. Invece che con decozione di china, si potrà detergere la piaga e l'impiastrino con infuso di camomilla, decotto di foglie di rose o simili.
 Per la preparazione di tale unguento vedi a pagina 265.

ESTRATTO PANERAJ

IL MIGLIOR PREPARATO
DI **CATRAME**

17 Sabato S. ANTONIO GENNAIO S. LIBERATA Domenica 18

Asma bronchiale

I Sp. della radice di poligala virginiana gram. cinque.
 " di ipecacuanana gram. mezzo
 f. inf. a col. di gram. centoventi
 aggiungete del benzodolo di soda gram. tre
 tintura di lobelia e di strepanto in gram. due
 estr. di stramonio e di giusquiamo in centigr. venti
 " di belladonna centigr. due
 " fluido di grindelia robustifolia gram. sei
 sciroppo del Tolu gram. cinquanta
 m.

S. un cucchiaino in zuppa tre volte al giorno un'ora prima del pasto o quattro ore dopo.

Più:

Prima del pranzo e prima della cena ogni volta
Due misurini di glicerofosfati granulari deblin.

Più:

A giorni alterni un'iniezione nella regione glutea di iodipina Merk e di sparteina con stricnina
 [sparteina centigr. 1 e stricnina mm. 1/2]
 Per nutrizione latte di uovo a preferenza

II. Sp. della diosina centigr. quattro
 bromuro sodico gram. quattro
 antipirina gram. due
 sciroppo di terebentina gram. dieci
 acqua bollita gram. centocinquanta
 m.

S. da consumarsi nella giornata.

Durante i pasti
bisogna bere la

VICHY-CÉLESTINS

19 Lunedì S. MARIO M. GENNAIO S. SEBASTIANO Martedì 20

III. Sp. della tintura di oppio gram. cinque
etere solforico gram. dieci
D. da 30 a 50 gocce, appena si manifesta
l'accesso, ogni 2 o 3 ore fino all'effetto.

IV. Del tabacco e canfora polv. aa gram. cinque
mentolo centigr. quindici.
D. ogni 15 minuti si ispiri per ogni narice
una o due prese.

V. dell'accesso
della tintura di belladonna di tatura stra-
monio aa gocce venti
piramironi gram. uno
acqua coccolata di lauroceraso gram. quindici
sciroppo di radice gram. trenta
porzione generosa gram. ottanta
D. un cucchiaino da minestra ogni mezz'ora fino
alla calma.

VI. oppure
dell'etere solforico gram. uno
estratto di belladonna centigr. cinque
acqua coccolata di lauroceraso gram. dieci
acqua distillata e sciroppo di corteccia di arancio amaro
aa gram. sessanta
D. un cucchiaino da minestra all'ora
fino alla calma.

(a) Cura nella calma: per quindici giorni
si radura per il verso e per altri quindici

ESTRATTO PANERAJ **contro i CATARRI** CRONICI E ACUTI

21 Mercoledì S. AGNESE GENNAIO S. GAUDENZIO Giovedì 22

giorni mattina e sera una pillola
di polv. di belladonna ed estratto malte
di belladonna \bar{a} centigr. trenta
M. sp. pillole N. 30.

(b) oppure per questi quindici giorni
Infuso di poligola 5% gram. cento
Sintura di tabella e sint. camforata d'oppio 2 gram. venti
ioduro potassico gram. otto
m. A mattina e sera un cucchiaino da minestra

VII Durante l'accesso s'introduce nella narice
un po' di cocaina centigr. cinque
mentolo centigr. dieci
vasellina gram. dieci

VIII oppure inalazioni di 5 a 15 goccie
di piridina

(a) Per cura: estr. e polv. di belladonna \bar{a} gram. venti
m. sp. pillole N. 50

A una al giorno aumentando ogni due
giorni di una pillola e per 15 giorni

(per i bambini tintura di belladonna due goccie per anno di

(b) negli altri 15 giorni un cucchiaino da minestra mattina
di tintura di tabella gram. cinque a dieci
arseniato di soda milligr. quattro a dieci
ioduro potassico gram. uno a cinque
bromuro potassico gram. uno a dieci
cloridrato di cocaina centigr. venti
Decozione di radice di salvia 3% ed acqua distillata \bar{a} gram. cento

Denti sani e bianchi colla " CARMÉINE "

VICHY-HOPITAL

AFFEZIONI DELLE
VIE DIGESTIVE

23 Venerdì SPOS. DI M. V. GENNAIO S. TIMOTEO Sabato 24

VIII. ^{lis}

nell'anna infan-
tile
p. tintura di lobelia
y. 15
" di belladonna
y. una
liquore Hoffmann
y. venti
acqua di tilio
y. novanta
un cucchiaino
in ogni 3/4
mezz'ora

Sel benzoinato gram. quattro
gomma arabica solv. D. olio di ricini in gram. venti
sciroppo semplice gram. cinquanta
Si emulsioni e si aggiunga
elixir paregorico gram. quindici
liquore di Hoffmann gram. due
acqua di fiori di arancio gram. centoventi
un cucchiaino da sinistra ogni tre
ore dopo di avere agitato bene la boccia

IX

benzocato sodico
gr. mezzo
liq. di aconito
y. quattro
" di belladonna
y. sei
di lobelia ed
grindelia
ca. y. due
sciroppo di besel
y. cinque
sartes
gr. quindici
g'ulebbe gommoso
gr. quarantacinque
per un barbi-
no di 18 mesi
un cucchiaino
in ogni 1/2
due ore e per
sei volte nella
24 ore

soluzione di adrenalina d'1% y. tre
acqua distillata e sterilizzata gram. dieci
iniezioni di 1 cc. nell'ossesso e subito questo
si può continuare l'adrenalina per bocca
alla dose di 5 - 8 y. due volte al giorno
Sel acqua distillata gram. quindici
solfato di atropina centy. uno
cloridrato di cocaina e di eroina in centy. cinque
sette y. tre volte al giorno
Sel liq. anisato di ammonio, l'indica-
di lobelia, di strofanto e tharsia ca. y. dieci
dieci y. tre volte al giorno
soluzione di adrenalina all'1% y. dieci
iniezioni in ammassata una al giorno. l'ind.

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

25 Domenica B. ARCANGELA GENNAIO

S. PAOLA

Lunedì 26

Per le parite e il latte

Sp. Dell'ossido giallo di mercurio centigr. venti
acetato di piombo cristall. centigr. una
vasellina gran. venti

Il leggero massaggio è vera sul margine delle palpebre

tre volte al giorno cura generale con emulsione d'olio di fo-
e per 10 minuti con galeo di mercurio o pithecol Berdeslo o
più volte al giorno acetato d'alluminio
gr. 30. acqua di st. gr. 100
E ogni due giorni per
una volta sulle palpebre
acido salicilico
centigr. 30
ossido di zinco gr. 1
vasellina e lanolina
ca. 400

II

collirio grosso gr. tra

aq. distillata gr. sei

d. nativa e ser. due fare e se dopo si formano
riavria l'effetto si passa

(b) nitrato di argento cristall. centigr. due

aq. distillata gr. dieci in tutti i casi un rubino
con il colorato di cada gr. due

acido salicilico centigr. dieci

aq. distillata gr. cinque

Bronchite. Tassi raffreddori

I codeina centigr. cinque

terpina centigr. trenta

arsenito centigr. uno

pat. d'ipercromia centigr. cinque

Balsamo del Polli e laurouano gr. p. p. 10

Si usa ogni ora a distanza dai pasti

PASTIGLIE VICHY-ÉTAT

Preparate coi
Sali Naturali

27 Martedì S. VITALIANO GENNAIO S. FELICE IV P. Mercoledì 28

Bronchite e bronco-pulmonite

I In un infuso tiepido di siglio, o in decotto di malva
gram. centoventi, si mescolano 4 o 5 cucchiaini
di benzocato sodico gram. due
ossimela scillitico gram. cinque
sciroppo del Vali gram. quaranta
sciroppo di fiori di arancio gram. venti
e si consuma un cucchiaino all'ora.

II Nella bronchite fetida:

alcoat a 500 gram. verdi
acido fenico ed acido tinnico in gram. cinque
acqua distillata gram. cento
e per inalazione.

III

foglie di sena in gram. tre a cinque, infuse in
solfato di magnesio gram. da otto a dodici
estratto di belladonna ^{o di atropina} centigr. da tre a cinque
" di lattuca lativa centigr. da dieci a venti
sciropp. d'iperico e di cicoria robusta gr. die
e un cucchiaino all'ora fino alla purgazione.

IV Bronco-pulmonite

ergotina gram. uno
solfato di stronina milligram. cinque
sciropp. di corteccia d'arancio amaro gram. cinquanta
acqua distillata di melissa gram. ottanta
e da uno a cinque cucchiaini da caffè sette
giornata

V capsule berbera di gindelia robusta

GOCCE JODO-FERROSE PAGLIARI

Soluzione titolata inalterabile

29 Giovedì S. FRANC. SAL. GENNAIO B. SEB. VALFRÈ Venerdì 30

V. *lij* bronco-pneumite negli adulti
cognac vecchio gram. venti
linfura di cannella gram. due
sinfura di stropanto goccie venti
sciroppo di elicina gram. trenta
acqua distillata gram. settanta
l. un cucchiaino ogni due ore

VI. *s* medicazione stimolante
acetato di ammonio e benzoato sodico in gram. un
sciroppo d'iperacucana e di bignonia in gram. venti
acqua di typhis gram. trenta
m. l. un cucchiaino ogni due ore

VII. nei bambini soggetti a convulsioni
muschio centigr. ventidique
suorlo di uovo n.º uno
Decotto di malva gram. cento
m. l. per un distillere.

oppure

assa fetida gram. un
p. infuso a caldo a colatura di gram. cento
suorlo di uovo n.º uno
— l. per distillere.

VIII. lanolina e vasellina in gram. trenta
essenza di prementina gram. quattro
m.
l. frizioni sul petto nei bambini

RENI
VESCICA

VICHY-CÉLESTINS

31 Sabato

S. MARCELLA

GENNAIO

Memorandum

IX

bronchite subacuta

Bell'estratto di radice di aconio centigr. venti
pasta di Bower benzoico e catrame purificato angram due

m. ef. pillola n.° quaranta

sei volte 24 ore, una ogni 2 o 3 ore

X

bronchite cronica

creosoto di faggio gram. venticinque
timolo e tintura di benzoico an gram. venti

eucaliptolo gram. dieci

alcool a 90° gram. duecento

m.

di sale miscela si versino due cucchiaini
in un litro di acqua bollita, e si beva
nelle 24 ore

XI

come espettorante

dello sciropp. d'ipocauana gram. da cinque a dieci

" di poligola gram. cinque

assimile scitibico gram. da dieci a venti

benzoato di soda gram. da due a quattro

infuso di liglio 5% gram. duecentocinquante

a cucchiaini da caffè o da dessert secondo

l'età

XII

Nella bronchite cronica dei bambini

Sp. ag. distill. gr. 250 iodio metallico gram. due

ioduro potass. gr. 10 tannino gram. quattro

ex. rat. di stramonio qst acqua sterile gram. trescentosessanta

li liquerizia gr. 10 zucchero gram. seicentoquaranta

di qst di sillabato uno o due cucchiainate al giorno

ANEMIA — FERRO PAGLIARI

metina e zera
una cucchiainata

Riassunto di GENNAIO

Date	INCASSI		SPESA	
	Ammontare delle visite • consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1			Brodo di legumi per i bambini	
2			un cucchiaino di minestra	
3			di grano, di orzo perlato, di fagioli secchi,	
4			di lenticchie, di piselli, di granduoco con	
5			duso con gr. cinque di sale da cucina	
6			posti a bollire in tre litri di acqua.	
7			Bronchite in bambini da 2 a 5 anni. vi è depressione.	
8			I. dell' acido di ammonio gram. uno	
9			benzoato di soda centigr. trenta	
10			sciroppo di cedro gram. trenta	
11			acqua di foglie gram. sessanta	
12			I. un cucchiaino di frutta nelle 24 ore	
13			II. del cloridrato di ammonio centigr. trenta	
14			benzoato di soda centigr. quaranta	
15			acqua di melissa e scirop. di poligela in gram. venti	
16			acqua distillata gram. cinquanta	
17			di un cucchiaino di frutta all'ora	
18			III. se la depressione non accentuata: come expectorante	
19			dell' ossido bianco di antimonio centigr. quaranta	
20			benzoato di soda centigr. trenta	
21			ossimuriacale scillitico gram. cinque	
22			sciroppo del Polin gram. venti	
23			infuso d' issopo gram. settanta	
24			I. un cucchiaino di frutta ogni ora	
25			IV. dello sciroppo di tremantina gram. centocinquanta	
26			I. un cucchiaino di frutta tre volte al giorno in un inf.	
27			caldo zafferano quando vi è tendenza a crasi di	
28			V. oppure terpina e benzoato di soda in centigr. trenta	
29			cognac gram. quindici	
30			acqua di foglie gram. settanta e cinque	
31			I. un cucchiaino di frutta all'ora	
Totale	VI	cloridrato di ammonio in gram. tre. testato	VI	totale

STITICHEZZA — GRAINS DE VALS

un cucchiaino all'ora

PASTIGLIE PANERAJ

IL MIGLIOR RIMEDIO
CONTRO
LA TOSSE

1° Domenica

S. ORSO

FEBBRAIO

PURIF. M. V.

Lunedì 2

I Casarro gastroenterico con prevalente stitichezza

del pancreas di soda e carbonato di calce in gram. 4
pepsina idroalcolica gram. quindici
iodoformo gram. tre

cumarina gram. sei

m. e fa polveri n° trenta in carta creata

1. una alle 7. una alle 10 ed una alle 18 di cui una g.

della prima ora di mattina un bicchiere d'acqua di

II Colarino aromatico gram. quaranta

f. c. diciannove al mattino per infuso in una tazza

di caffè e se vi è stitichezza si aggiunga tinda di ro

mezz'ora prima pranzo di dieci a trenta goccie di

tintura di assenzio, di zenzero e di cascario in g

" di rosa vanica gram. venti

la sera tre ore dopo il pranzo una polvere

di carbonato di calce precipitato gram. tre

magnesia calcinata gram. quattro

m. e f. polveri n° dodici

III Per i bambini lattanti

Dell'acido cloridrico goccie cinque

" lattico goccie venti

pepsina gram. mezzo

siroppo di cedro gram. venti

1. un cucchiaino di caffè prima di allattare

ed uno dopo di aver allattato.

Dopo i pasti
DUE o TRE

PASTIGLIE VICHY-ETAT

facilitano
la digestione

3 Martedì

S. BIAGIO

FEBBRAIO

S. AVVENTINO

Mercoledì 4

IV Sp. del calamo aromatico gram una
 valeriana silvestre gram. 400
 per infuso in gram cento di decozione di china 4 gr
 si leva la mattina in una volta, e dopo
 un'ora si prende latte. alle 10 e alle ore
 18 si prenda una polvere
 di estratto di caffeina centigr. ventiquattro
 cloridrato di chinina centigr. quaranta
 m. of. pulvis due
 e si aumenti la caffeina fino a centigr. quaranta

V della valeriana silvestre, calamo aromatico,
 e radice di colombo a gram sessanta
 legno quassia gram. trenta
 m. of. cartine 10. venti
 la mattina per infuso preparato la sera avanti
 o. b. se vi è stitichezza si aggiunga rabarbaro gram. tra

VI Per svegliare l'appetito e calmare le febbre.
 Sp. del nitrato di stricnina centigr. cinque
 acqua distillata gram dieci
 di in quattro o dodici gocce al giorno in acqua
 prima del pasto principale: dopo venti giorni
 si sospenda per quattro giorni, indi si ricominci
 nunci con la dose iniziale di quattro gocce

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA TOSSE

5 Giovedì S. AGATA V. M. FEBBRAIO S. DOROTEA Venerdì 6

Dispepsia flatulenta dolorosa
 I. del bromuro di stronzio gram. sei
 bicarbonato di soda gram. quaranta
 carbone vegetale e pollicarbonato di bismuto ogni
 porzione gommosa gram. Duecento
 1. Due cucchiari da the in acqua tre volte al giorno
 dopo i pasti

II. del condurango bianco gram. sedici
 acqua di fonte gram. Duecentocinquanta
 " coccolata di Lauraceraso gram. quaranta
 sciroppo di fiori di arancio gram. sessanta
 1. Due cucchiari al giorno avanti i pasti aperta la bocca.

U. B. Nei neuropatici alla su scritta formula
 si aggiungano dieci a quindici gram. di bromuro
 sodico e gram. quattro di tintura clerea di
 leriana silvestre.

III. Opopeptol - Erba
 1. venti gocce dopo i due principali pasti del giorno

IV oppure tintura di assenzio.

V del carbone di fraudin gram. dieci
 estratto di oppio centigr. dieci
 m e f. palm. n. quindici con ostie

Non dimenticare
di indicare chiaramente

VICHY-ÉTAT

nel prescrivere le Acque
ed i Prodotti di Vichy

7 Sabato S. RICCARDO FEBBRAIO S. CARLOTTA Domenica 8

Dispepsia con vertigine stomacale

I Sp. bella magnera calcinata centigr. trenta
creta preparata e bicarbonato sodico in centigr. venti
polver. di rore vomica centigr. tre
polver. di radice di belladonna centigr. due
in s.p.c.

Si da prendersi subito dopo il pasto Due vol
te al giorno

*Dispepsia con vomito, senso di secchezza in bo
ca, peso all'epigastrio dopo i pasti, stitichezza*

II Pepsinasi del Istituto Sieroterapico Milanese
in un piccolo cucchiaio in un pò d'acqua po
chi minuti dopo ciascun pasto.

III *Dispepsia da nevrosismo*

pepsina gr. tre
pancreatina gr. due
Poka Haston gr. uno
mef. r. dieci
d'una lzo d'acqua
potabile
Magnera ustae e bicarbonato sodico in gram. sei
nole di carbone di d'elloe gram. cinque
urotropina gram. quattro
mef. c. d. trenta
tre al giorno dopo i pasti

IV Estratto fluido di condurango-kola cocacina in gram. dieci

Opopeptol acido cloridrico medicinale e pepsina idroloma in gram. dodici

C. Erba saccharato di menta e vaniglia in gram. cento

gocce macerazione idr. alcoolica di cortecia d'arancio amaro gram. settanta

Glicerofosfato di sodio gram. sei

nitrato di straconina centigr. cinque

Si un cucchiaio due volte al giorno in acqua prima

CATABRI — ESTRATTO PANERAI

Si due pasti principali

ESTRATTO PANERAJ

IL MIGLIOR PREPARATO
DI **CATRAME**

9 Lunedì S. APOLLONIA FEBBRAIO S. SCOLASTICA Martedì 10

Cardiopatia: come diuretico

Ip. del nitrato di pilocarpina centigr. Due
estr. di scilla, resina di giugginella e di scamonea in centigr.

m. sp. pill. n.º quattro

P. una ogni 4 ore e per 4 o 6 giorni.

Cardiopalm

I monobromuro di canfora gram. mezzo

ossido di zinco gram. mezzo

estratto secco di belladonna centigr. cinque

estratto semplice q. b. per fare pillole cinque

d. una ogni due ore

II acqua distillata gram. centocinquanta

bromuro di potassio gram. due a tre

acqua coibata di leucoterep gram. uno a due

sciroppo di morfina gram. quindici

d. un cucchiaino ogni quarto d'ora o mezz'ora

Nota. Se vi è tachicardia o aritmia

foglie di digitale gram. uno

si infuso a colatura di gram. cento

bisolfato di chinina gram. mezzo

liquore anisato di ammonio gram. due

sciroppo di cedro gram. venti

d. un cucchiaino ogni mezz'ora

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Servono a prepararsi da sé l'acqua alcalina gasosa. Molto economici.

11 Mercoledì s. FRUTTUOSO FEBBRAIO s. EULALIA Giovedì 12

Cistite

I. In Soli belle perle di sandalo e scabolo

(b) Irrigazioni con soluzione di acido bórico 1% oppure di permanganato di potassa 1%

N.B. se l'urina, col catetere, esce mista a pus o a muco si praticano irrigazioni con nitrato di argento crist. centigr. Otto acqua sterile gram mille

II

Pagèol flac. due

10 a 16 capsule al giorno nell'intervallo di pasti ed ancora ripartite prima di pasti

III

ureone flac.

8 da 1 a 10 cachets al giorno con un'ora e mezzo d'intervallo e distante dai pasti

ESTRA

Dolori della colica epatica

Pr. canfora polverizzata	gr.	0,04
Oppio polverizzato	"	0,05
Estratto di belladonna	"	0,02
Estratto di giusquiamo	"	0,02

per una pillola. Una pillola al momento del dolore.

**I CATARRI
NICI E ACUTI**

13 Venerdì

NTINO Sabato 14

(Journal des Praticiens)

Colica epatica

*I Bell' edere solforico gram. quattro
emuls. di gomma arabica gram. cent. ve
t. un cucchiaino ogni quindici minuti*

*II clorofornio e tintura di mirra ai gram.
mucilagine di gm. arabica gram. dieci
sciroppo semplice gram. novanta
d. un cucchiaino ogni quindici minuti*

*III valerianato di amilo centigr. sessanta
olio di mandorle gram. otto
pols. di gomma arabica gram. cinque
scirop. di castagne gram. trenta
acqua distillata gram. sessanta
d. in una volta in mezzo bicchieri di latte*

*IV calomelano a dosi ripetute arrivando
a grammo mezzo per giorno*

*V per fluidificare la bile
olio di oliva gram. cent. venti
per ogni mattina*

*VI oppure acido salicilico gram. due
estratto secco di belladonna centigr. la quarta
m. f. c. 4
d. due a quattro al giorno*

VICHY-CÉLESTINS

GOTTA
DIABETE
RENELLA

15 Domenica

s. EFISIO

FEBBRAIO

s. GIUSTO

Lunedì 16

VII

- Sol salicilato sodico gram Dieci
 benzoato sodico gram venti
 m. sp. valer. n° trenta
 S. Due o tre polveri per giorno in un bic-
 chier d'acqua alcalina tra i pasti

VIII

Soluzione di adrenalina al % gram cinque
 S. cinque goccie ogni tre ore fino a gola fredda

IX

(a) acqua cloriformica satura gram sessanta
 acqua distillata di tiglia gram cinquanta
 sciroppo di clorofila e glicirina aa gram trenta
 S. una cucchiaiate da zuppa ogni 15 minuti fino
 alla cessazione della crisi dolorosa

(b) localmente cataplasmi caldi previa unzione
 di balsamo tranquille gram quaranta
 estratti di oppio di belladonna e di jinsquiana ii gram
 cloriformis gram dieci

X

Sp. idrolato di valeriana gram centocinquanta
 bromuro di sodio gram. lxx
 laudano goccie quaranta
 sciroppo di morfina gram venti
 m. S. un cucchiaio all'ora fino alla calura

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

17 Martedì s. MARIANNA FEBBRAIO s. SIMEONE v. Mercoledì 18

Cheratide (Probabile infezione e irritazione oculare)

I (a) Sol. del cloridrato di cocaina centigr. quindici
soluzione di Adrenalina 1% gram. uno
d. mattina e sera una goccia nell'occhio

(b) una iniezione al giorno nella regione glutea
di cianuro di mercurio centigr. venti
cloridrato di cocaina centigr. quindici
acqua distillata e desinfezzata gr. m. venti

II (a) se vi è congestione della congiuntiva
del cloridrato di cocaina centigr. venti
soluzione di Adrenalina 1% goccie quindici
Duboisina centigr. dieci
acqua distillata e desinfezzata gram. dieci

d. due goccie nell'occhio la mattina

(b) iniezioni di cianuro di mercurio

III (a) Iodina centigr. dieci
ioduro sodico centigr. dieci
acqua distillata gram. dieci
d. mattina e sera due goccie nell'occhio

(b) Pillole di alvetal Courtois No
d. due pillole dopo il pasto principale

Malattie dello
Stomaco e degli Intestini

VICHY-HOPITAL

19 Giovedì S. BEATRICE FEBBRAIO S. LEONE Venerdì 20

Colica intestinale

I soluzione di adrenalina 1% gram cinquanta
1/5 cinque goccie ogni tre ore fino a guisa tranquilla

II (a) Infuso di matrignaria camomilla 5% gram cento

(b) enteroclini con infuso di foglie di sena 10%
gram. Duemila
solfato di magnesio gram sessanta

III quando gli accessi dipendono da neurastenia
con gonfiore dello stomaco
ss. magnesio ossido e bicarbonato sodio ad guisa
carbone di Betloe gram. cinquanta
urotropina gram. quattro
m. ef. c. n. 10
1/5 una prima di ciascun pasto.

IV per calmare il dolore
ss. inf. di valeriana 4% gr. centocenti
bromuro di sodio gram. tre
laudano goccie trenta
sciroppo di morfina gram. trenta
1/5 un cucchiaino all'ora fino alla calma

SCIROPPO PAGLIARI

Purgante Comodo
Efficace - Sicuro

21 Sabato s. ELEONORA FEBBRAIO s. MARGHERITA Domenica 22

congiuntiva (trauma)

I. Antitracomato ferrara fluc.
 con un batuffolo di cotone imbevuto nel liquido
 si strofina la congiuntiva una volta al giorno
 (Dott. A. Ferrara: Cas. Professa 19 Palermo L. 3. 90
 Più lavaggi con acqua distillata gram. cinquante
 sublimato corrosivo centigr. dieci
 m.

II. acqua distillata gram. venti
 nitrato di argento crist. centigr. quaranta

Si una pennellata sulla congiuntiva palpebrale
 previamente raschiata dalle granulazioni,
 e subito seguita per neutralizzare l'azione
 di nitrato di argento, con una pennellata
 di soluzione saturata di cloruro sodio.
 Tale medicatura si fa due volte la settimana

III. Sella glicerina gram. venti
 acido tartarico gram. uno

Si una goccia al giorno nell'occhio

IV. Solfato di rame centigr. quindici
 glicerina neutra gram. sette
 Si applica nell'occhio una goccia al giorno previa lavaggio
 di acido salicilico centigr. dieci, acqua Carico gram. Dieci
 acqua distillata gram. cinquante.
 due volte la settimana Iniziare sulle palpebre coperte col batuffolo

Per impedire le FRODI

e le sostituzioni bisogna aggiungere sulle ricette alla parola VICHY il nome della Sorgente.

23 Lunedì S. PIER DAM. V. FEBBRAIO

S. MATTIA

Martedì 24

V collirio getto Del Prof. Morelli

flu.

VI Dopo una energica raschiatura delle gargarismi si striscia col solfato di rame e si allena per ogni settimana i seguenti

1. solfato di rame centigr. Dieci

glicerina neutra gram. cinque
collirio.

2. acido tartarico centigr. Dieci

glicerina neutra gram. cinque

3. Gargarol ben.

1 Due cucchiaini al giorno mezz'ora prima in due principali pasti

GOCCE JODO-FERROSE PAGLIARI

Soluzione titolata inalterabile

25 Mercoledì LE CENERI FEBBRAIO S. ALESSANDRO Giovedì 26

Congiarabile casarrale

I Sp. dell'acqua di rose gram venti
 soluzione di sublimato corrosivo 1% gram venti
 solfato di zinco (o di stronzio) centigr. venti
 glicerina oftalmica e laudan. an gram cinque
 d. mattina e sera una goccia nell'occhio

II Nella soluzione di adrenalina 1% gram due
 solfato di atropina centigr. cinque
 cloridrato di cocaina centigr. dieci
 acqua distillata gram venti
 d. istillare una goccia al giorno nell'occhio

III per lavaggi
 Sp. acqua distillata gram cinquecento
 sublimato corrosivo centigr. dieci
 oppure soluzione calda
 di salicilato di soda gram cinque
 acqua sterile gram cento

IV a) bicarbonato di soda gram due
 acido salicilico centigr. dieci
 acqua distillata gram cinquecento
 d. lavaggi tiepidi interni ed esterni tre volte
 al giorno facendo il cotone idrofilo in

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

27 Venerdì S. ONORINA FEBBRAIO S. TEOFILO Sabato 28

bersaglio in tale soluzione per cinque mi-
nuti sulle palpebre chiuse, e dopo s'ubbi-
la una o due goccie

b) Si prolunga centigr. venti
acqua distillata gram. sette

Ma si medica così per quindici giorni e
poi per altri quindici giorni si sostituisce
il collirio con

c) idroborato di ammonio e solfo fenolo
di zinco aa centigr. cinque
laudano centigr. dieci

acqua distillata gram. quindici
e per altri quindici giorni e poi si ritor-
ni alla prima medicatura

(2) oppure collirio giallo gram. tre
acqua distillata gram. sei

Solfoclorato di
Zinco
cento cinque
aq. di lauro ceraso
gocce venti
aq. Mercurio
gram. dieci
i. 2 gocce rosi ock

o due goccie mattina e sera sull'occhio
tre volte al giorno lavaggi e compresse

d) idroborato di soda gram. due
acido salicilico centigr. dieci
acqua distillata gram. cinquanta

(1) usò per quindici giorni e se non si ottenne
l'effetto, si passi alla instillazione di un goccia
di nitrato di argento cristallo centigr. due
acqua distillata gram. dieci

V

congiuntiva oculare e cornea
Collirio giallo del Prof. Morelli
Dr. Mari

Riassunto di FEBBRAIO

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1			Congiuntivite flicterulare	
2				
3	1		Sp. del protargolo centigr. quaranta	
4			acqua distillata gram. dieci	
5			in bac. oscura	
6			D mattina e sera Due goccie nell'occhio	
7				
8			Si è precipitato grallo di mercurio centigr. venti	
9			vasellina gram. dieci	
10			Si quando con punta di spillo nella congiuntiva	
11				
12			cura di arseniato di ferro - prendere	
13			la da 24 iniezioni di iodo-vecitina (10 gr.)	
14			praticate a giorni alterni.	
15				
16	71 (a)		solfato di rame centigr. quindici	
17			acqua distillata gram. dieci	
18			in uso a due goccie nell'occhio la mattina	
19	(b)		ossido grallo di mercurio centigr. dieci	
20			vasellina bianca gram. dieci	
21			Si quando con punta di spillo nella congiuntiva	
22			la sera.	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
Totale				TOTALE

PASTIGLIE PANERAJ

IL MIGLIOR RIMEDIO
CONTRO
LA TOSSE

1° Domenica

S. ALBINO

MARZO

S. SIMPLICIO

Lunedì 2

Colica nefr'ica

(a) Sp. del cloridrato di morfina centigr. cinque
acqua coccato di lauroceraso gram. dieci
bromuro di potassio gram. dieci
scioppo d'etere gram. trenta
tiroloato di valeriana gram. centodieci

Si un cucchiaino all'ora fino alla calma

(b) si applicheranno contemporaneamente
se sull'addome parecchie faggi di fl.
rietta imbottite

Di balsamo tranquillo gram. quaranta
cloroformio gram. dieci
estratto di oppio, di giusquiamide
di belladonna ii gram. uno
ricoprano il tutto con gutta-perca laminata

N.B. Le iniezioni di morfina sono da
evitare perché impediscono la marcia
del calcolo

II
soluzione di adrenalina al 1% gram. cinque
di cinque goccie ogni tre ore fino a goccie trenta

10 Centesimi il pacco
per un litro d'acqua

SALE VICHY-ÉTAT

3 Martedì

S. CUNEGONDA

MARZO

B. UMBERTO

Mercoledì 4

Corizza

I antipirina per annosare a volte una
piccola dose di mentolo

II salicilato sodico per annosare

III acido salicilico oppure adone solo per annosare

Confezione cerebrale

Trinitrina

10 gocce due al giorno
e nei periodi di forte crisi
una iniezione di trinitrina

corizza un'erezione mucosa-purulenta
cloridrato di cocaina centigr. dieci
mescolato con per quindi
lattosio gram. due e mezzo
polvere di caffè tostato gram. mezzo
per filtrare un pizzico alla volta

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA TOSSE

5 Giovedì

S. FOCA GIARD.

MARZO

S. MARZIANO

Venerdì 6

Cerume nel condotto auditivo

Sp. della glicerina gram. venticinque

boracina gram. mezzo

alcol gram. quattro

1. Va data a quindici goccie istillate nel condotto auditivo

*dopo che il cerume è rammolito, si
praticano lavaggi con infuso tiepido di camomilla*

Durante i pasti
bisogna bere la

VICHY-CÉLESTINS

7 Sabato

S. TOMASO

MARZO

S. GERARDO

Domenica 8

contro i calli

I Sp. Bell'acido salicilico gram. uno
 estratto alcoolico di canapa indica gram. mezzo
 alcool a 90° gram. uno
 etere a 62° gram. due
 collodion elastico gram. cinque

U. si pennelli il calla e dopo otto giorni
si estirpi con pediluvio caldo.

II Sol. collodion elastico gram. cinque
 acido salicilico gram. mezzo
 thymolo centigr. venti

U. uso esterno

ESTRATTO PANERAJ

IL MIGLIOR PREPARATO
DI **CATRAME**

9 Lunedì S. FRANCESCA MARZO I 40 SOLDATI Martedì 10

Colera Tre polsi

1 come preservativo

Sp. dell'acido cloridrico gram. quindici
in gram. mille di acqua di fonte per bere

2 cura

Sp. della canfora ed acido tartrico a gram. due
acido fenico gram. uno e mezzo
alcool gram. quindici
acqua distillata gram. cento
di un cucchiaino da caffè al giorno

Disideri nutritivi

Fosfato di soda e cloruro
aa gr. due
peptone solubile e Destrina
aa gr. quindici a venti
acqua sterile
gr. duecentocinquanta

Si potrà aggiungere un cucchiaino di cognac e di van
di per distendere e poche goccie di laudano
La fare a quagnò di sali cloridici al giorno

VICHY-HOPITAL

AFFEZIONI DELLE
VIE DIGESTIVE

11 Mercoledì s. COSTANTINO MARZO s. GREGORIO Giovedì 12

	<p><i>Dissenteria amebica (1)</i> sette fiale di cloridrato di emetina n° 20 le iniezioni endomuscolari ogni 12 ore ogni secondo la gravità, sospendendo qualche giorno le iniezioni e praticando cateterismi di ipercultura con xx gocce di laudanum per il dolore e con xx gocce di soluzione di adrenalina se le scariche sono troppo sanguinolente: latte ghiacciato, qualche li- monata ed aromate fresche, affi frutta proibiti gli alcoolici. Quando le scariche sono modificate si concedono brodi, pu- re di legumi, poi le uova, le pastine, i gnoc- chi, le carni bianche ed infine frutta cotta. Se le perdite liquide sono delle grandi si pre- dica l'ipodermoclisi e se il soggetto è ma- larico si praticano iniezioni di chinino nella corrente scura e le forze come na- tute si usano iniezioni di metilarzina di sodio.</p>
<p><i>Fiebra nell'auria latte e brodi legumi in seguito pure di legumi e minestrone</i></p>	
<p>11</p>	<p><i>un cucchiaio di zuppa di olio di vasa- lina ogni due ore fino alla scomparsa del muco qualche distese di bicarbonato sodico 2%</i> (1) <i>ritardando perché poche di muco sanguinolento che per i sottoposti al microscopio si evaporati in soluzione fisiologica si nota la mobilità delle amebe</i> (2) <i>si pratica la cateterizzazione con siringa fisiologica per in- iettare due volte in tubo anche</i></p>

ESTR

TABELLA DIETETICA PER I DIABETICI

CATARRI

CRONICI E ACUTI

13 Venerdì

S. ELDERADO

MARZO

S. MATILDE

Sabato 14

Diabete mellito

I Dieta assoluta e surganti quotidiani per
 affamare l'organismo, e così produrre
 un'autofagia fino a totale combustione
 delle zuccheri anormali, il che vien di-
 mostrato con l'analisi delle urine; così
 si passerà ad una vera rieducazione nutri-
 tiva, ritornando lentamente all'alimen-
 tazione ordinaria, sempre guidata dall'ana-
 lisi dell'urina; onde sono da escludere
 gli alimenti produttori di purine, quindi
 assolutamente vietate le carni, le uova,
 alcune leguminose, la frutta e le bevande
 alcoliche. Sono permesse alla funzione
 del fegato già tanto ridotta.

N.B. tutto ciò è inefficace se il Diabete dipende
 da un cancro, tubercolo, lesione cerebrale

II

Pillole del dott. Séjournet flu.

una pillola ad ogni pasto

iniezioni di insulina per il Dott. A. Lazzeri
 sulla
 via Goldoni 39

iniezioni di pituitaria
 o infusione di adrenalina o pituitaria o pituitaria

III

Sp. foglie orali di eucaalyptus n° 10

di Dec. a col di gr. 50

si beva la sera e la stessa quantità la mattina

IV

Compresse antidiabetiche del Dr. Moretti

Giarrea Vomito o Diarrea

nei bambini oltre.

PASTIGLIE VIGNY-⁷⁶ AT

Preparate coi
Sali Naturali

15 Domenica

S. LUCREZIA

MARZO

S. AGAPITO

Lunedì 16

Diarrea

I

benzonnafato gram quattro
salicilato di bismuto gram sei
m. ef. polveri n° 10

d. una ogni quattro ore da prendersi fino a cinque
polveri in acqua nella giornata

II

benzonnafato gram cinque

diarrea viscerale

acido lannico gram una

bambini

m. ef. polveri n° 10

calcolina

come sopra

1 o 2 misurini in

per bambini

un cucchiaino d'acqua

benzonnafato e zucchero candido in gram due

per ogni 999 parti

vedi altra

m. ef. polveri n° 10

a pag 72

1 tra polveri di giarrea

IV

acqua distillata gram sessanta

enterocolite

laurigena centigr. sessanta

elidiformia

acido lattico gram due

d. in mercurio

sciroppo di gomma arabica gram. trenta

presso a questo

un cucchiaino di m. ef. aventi ciascuna poppola

di giarrea

essendo le diarree di giarrea

V

solfato di ab. gram dieci

V bis

da mattina in un bicchier d'acqua zuccherata

Chrimina

dieta idrica e riposa: se le scariche sono

serena

di calore e lana vapor e pol. di iperuranio in centigr. dieci

(diarrea dei lat)

per quattro misurini e dopo la sera

tant

acqua ossigenata gram. trenta

laude no. 10. una a mercurio, acqua stabile

non riparsi al latte bollito o condensato di una di giarrea

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

17 Martedì S. PATRIZIO MARZO S. GABRIELE Mercoledì 18

I Diarrea (massima) quando le scariche diar-
roiche vengono dopo l'ingestione di pasto
senza costringere gli ammalati alla be-
vanda liquida, si possono prendere dieci
minuti prima di tre pasti giornalieri
di un cucchiaino di acqua, dieci goccie
di acqua di menta gram cento
clarificato di cocaina portato a ebullizione in gram tre
n. per i bambini metà o meno secondo l'età

II della polvere d'iperammina gram uno
f. cart. n. cinque
L'ogni due ore una in una tazza d'infu-
so caldo di the o di tiglio
n. b. nel primo giorno dieta liquida escluso il latte
nel secondo giorno che cessa la diarrea, si ripi-
glia la dieta ordinaria esclusa la carne

III dell'emulsione di gomma arabica gram cento
allume crudo pulverato gram uno
saleto gram uno
sciroppo di radice gram venti
di un cucchiaino all'ora, nei bambini un me-
diaino da caffè se vi è tenerezza e
gli adulti si aggiunge l'ambrosia per la
bevanda

IV del sonnifero o sannalbina gr. due
f. cart. n. quattro una ogni due ore
n. b. per i bambini f. cart. n. otto quattro giorni

RENI
VESCICA

VICHY-CÉLESTINS

19 Giovedì

S. GIUSEPPE

MARZO

S. CLAUDIA

Venerdì 20

V Sp. dell'acido lattico gram. due a quattro
 tintura di radicea gram. tre
 acqua bollita gram. cento
 sciroppo di acodio gram. dieci
 1 un cucchiaino ogni tre ore

VI nella colite infantile massime quan-
 do le feci emanano odore putrido

Sp. dell'acqua ossigenata gram. cinquanta
 fosfato di sodio gram. tre
 cloruro di sodio gram. cinque
 bicarbonato di sodio gram. uno e mezzo
 1/2 compressa truo
 volte al giorno c
 quante a 1/4 di com
 stessa 2 volte al giorno

VII Diarrea estiva

Sel parrigens gram. uno
 olio di ricini gram. due
 tintura di cloriformio composto gram. uno
 mucilagine di gomma arabica gram. otto
 sciroppo semplice gram. cinque
 acqua di anici gram. quindici
 1 ai bambini di un anno ogni quattro
 ore un cucchiaino da caffè

VIII diarrea sub acuta o cronica

Sel nitroso di argento crist. centig. acqua
 glicerina gram. due
 acqua distillata gram. cento
 sciroppo semplice gram. venti
 1 un cucchiaino da caffè ogni due o tre ore

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO INALTERABILE

21 Sabato S. OTTAVIANO MARZO S. BENEDETTO Domenica 22

IX (a) Diarrea di poppani: forma acuta.
 Per sei o dodici ore dieta idrica, indi un
 cucchiaino di olio di ricini o mezzo cucchiaino
 porzione una di magnesia calcinata. Adimento
 Vigier no giorno ridotto fino ad un terzo del
 ufficiale del normale, e nello stesso tempo infuso
 Pacelli di the con un centigrammo di soda
 4 o 5 cucchiaini rima e latte diluito con mucilagine
 nella caffè ed di legno. Passata la diarrea si ridanno
 6-24 ore gli ideali di carbonio sotto forma di far-
 ina destrinizzata con amido, ma lattario.
 Nella forma cronica lo stesso trattamento,
 meno della dieta idrica iniziata.

(b) Per arrestare più l'eccessiva diarrea, quando è,
 di tannigino o tannalbina gram. tre
 mucilagine e di gomma araba gram. dodici
 saccarina ~~per~~ centigram. due
 acqua distillata gram. cinquanta
 un cucchiaino da caffè ogni due ore.
 collonitrato di bismuto gram. due
 mucilagine e di gomma araba gram. dodici
 saccarina centigram. due
 acqua distillata gram. cinquanta
 di come lo precedente.
 lattato di calce gram. dieci
 acqua distillata gram. cento
 di un cucchiaino da zuppa tre a quattro
 volte al giorno con i pasti.

citrate e bicar
 bonato di sodio
 ca gr. 3
 fosfato di sodio
 solfato di sodio
 gr. 1
 saccarina (e)
 centin. 5
 acqua distillata
 gr. 100
 di un cucchiaino
 da zuppa ogni 2
 o 3 ore prima
 del pasto
 fino alla san-
 guine del
 mima e fino
 a che le feci
 non appaia-
 no un aspetto
 quasi normale
 per consistenza
 e colore.

Dopo i pasti
DUE o TRE

PASTIGLIE VICHY-ETAT

facilitano
la digestione

23 Lunedì B. VERECONDO MARZO S. BERTA Martedì 24

X Diarrea dissenteriforme
 ℞ Del benzoinato gram quattres
 gomma arabica pura ed olio di ricini an gram. x. each
 acido lattico sciroppo semplice gram. cinquanta
 gr. lxx emulsione ed aggiungi
 elisir parégorico gram quindici
 gr. lxxa liquore di Hoffman gram due
 essenza di timo acqua di fiori di aranci gram centocent
 gr. unta si agiti bene prima di usare
 acqua distillata di menta adulta un cucchiaino da min
 gr. cento tra ogni tre ore nei bambini, e
 una cucchiaino con lo sciroppo un cucchiaino da caffè
 in la caffè ogni tre o cinque ore, con diete si
 asciutta di riso o latte.

XI Dissenteria
 giovane molto compresse calde intorno al corpo
 una grande calomelano a vapore un'ora cinquanta
 dose di polvere. Dopo sei ore un clistere con
 Dipepsimane salicilato di soda gram. lxxviii
 presa la mattina laudano gr. lxxviii
 alle 4 con una acqua sterile calda gram. seicento
 boccata di latte. Tale clistere si ripeterà nel 2° e 4° giorno
 e per 5 ore o nel 3° e 5° trattendolo con 2 o 3 più
 ripetizioni e dopo si dia ogni 4 ore polv. di Dover con
 un uovo. Per i bambini al decimo dell'anno il clistere sia
 bevendo di salicilato di soda gram. due
 continui con acqua sterile calda gram. cento
 o un uovo e la carne di polv. di dipepsimane con gr. dieci
 o un uovo verso il 3° o 4° giorno.

GOCCE JODO-FERROSE PAGLIARI

Soluzione titolata inalterabile

25 Mercoledì SS. ANNUNZ. MARZO S. EMANUELE M. Giovedì 26

Dismenorrea

I Sp. del bromuro sodio ed estratto fluido di ~~Viburnum~~
 prunifolium aa gram. uno e mezzo
 tintura di rabarbaro gram. tre
 antipirina gram. uno
 acqua distillata gram. cento cinquanta
 sciroppo di cedro gram. venti
 m. p. due cucchiaini ogni due ore

II (a) Riposo a letto per periodo mestruale e per
 i due giorni che seguono
 appena comparso il segno precursore
 si pratichi per tutta la durata del flusso
 un clistere: acqua calda gram. sessanta
 laudano gocce da 10 a 20
 bromuro sodico gram. uno e mezzo

(b) sulla regione lombare cataplasmi
 caldi umidi di lin seme, o impacchi con
 ovatta calda

(c) eumenol Merck
 da quattro a sei soboleidi nella giornata
 a due per volta due ore prima del pasto
 incominciando due giorni prima dell'ap-
 parire del flusso mestruale

Non dimenticare
di indicare chiaramente

VICHY-ÉTAT

nel prescrivere le Acque
ed i Prodotti di Vichy

27 Venerdì S. GIOV. GRIS. MARZO S. SISTO P. Sabato 28

III Nella crisi dolorosa
bagni caldi a 38° per minuti 30 a 40 anche
se vi è un leggero stato sanguigno

(a) unzioni sulla parte addominale

tre pillole al giorno di sedo
menstruo propo
rato del dato
ratorio 7 a 10
tozto strepito
e anco
quattro pillole

di olio di camomilla e di giusquiamo in gram. venti
clorofornio gram. dieci
tintura di oppio gram. otto

Lece in omnia
ciando otto pillole
prima 12 (c) 0
falso non
stare

balsamo tranquillo gram. quaranta
Laudans del Sydenham gram. cinque

chloralis iodato e camphora an. giusquiamo
tintura di oppio gram. dieci
lanolina gram. venti

Si applichi sopra la parte medicata un cataplasma di leggero opestore di lin seme

(d) Decotto di semi di lino gram. centocinquanta
antipirina gram. uno
tintura di belladonna 10% gomme cinque a dieci
Laudans gomme quindici a venti
J. per un clistere a 90° a bagno marie

IV ergotina centigr. dieci
solfato di chinino centigr. due
polvere di digitale centigr. uno
polvere di coca q.s. per una pillola
J. da tre a cinque al giorno

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ANTICOL”

29 Domenica

S. SECONDO

MARZO

B. AMEDEO

Lunedì 30

Diuretici Pizinsittale
salato e urotropina in gr. sei
m. sp. e. n.º 12
f. m. al giorno

Diuretici (incontinenza di urina)
estr. di rosa variosa e di belladonna in centigr. uno
di regale curata e tatarale rosso e paladice in centigr. uno
in et. pillola
f. gr. n.º 60
d. una a sei al giorno

Seco congestione

I antiphtosittine - boracato

II acido salicilico gr. cinque
" borico gr. venti
aq. distillata gr. mille

f. compresse calde

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Servono a prepararsi da sé l'acqua alcalina gasosa. Molto economici.

31 Martedì

S. BALBINA

MARZO

Memorandum

I

Essenziale intestinale
dell'emulsione di gomma arabica gram. due
soluzione alcolica d'acido fenico goccie tre
soluto gram uno
sciroppo di c. d. ro gram venti
d. due cucchiaini all'ora.

II

dell'emulsione di gomma arabica gram. cento
soluz. alcolica d'acido fenico goccie quattro
resorcina gram. due
laudani gram. dieci
d. un cucchiaino in gram cento di acqua
rite per un clistere.

III

Diolactyl Fournier fl
1. ca. 6. a. 3. compresse per giorno prima dei
due pasti principali per i fanciulli
Da uno a quattro secondo l'età potrosizza
Se diluito in un poco d'acqua succosità
o latte bollito e biopido in tre o tre volte

Essenziale ed antihelmintico
emulsione gommosa gr. 150-200
Xeroformio gr 1-150-2
carbonati. calce 1-2
essenza di finocchio e di cannella aa q. b.
sciroppo di alkermes gr. 30-40
d. un cucchiaino all'ora.

Riassunto di MARZO

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1			Depilatorio / peluria nel viso delle Donne /	
2				
3			I. Sp. dell'aceto di salcio centigr. trenta	
4			ossido di zinco gram. due	
5			vasellina gram. venti	
6			lanolina ed acqua di rose aa gram. cinque	
7			m. per uso esterno.	
8			si passi la parte con questa pomata l'azio-	
9			ne della quale è tenuta una cordante.	
10				
11			II. Polvere di amilose gram. quaranta	
12			acido salicilico gram. due	
13			si cospargue la lanuggine ogni sera	
14				
15			III. Lintura di iodo presa gram. uno e mezzo	
16			essenza di trementina gram. tre	
17			olio di ricini gram. due	
18			alcool a 60° gram. venticinque	
19			colloidion gram. cinquanta	
20			si unga la parte veltata per tre o	
21			quattro giorni di seguito con questa mi-	
22			stela, i peli aderiranno alla crosta col-	
23			loidionata che si formerà, e non si la-	
24			vera la parte unta se non quando la	
25			operazione sarà terminata.	
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Totale			TOTALE	

PASTIGLIE PANERAJ

IL MIGLIOR RIMEDIO
CONTRO
LA TOSSE

1° Mercoledì S. TEODORA APRILE S. FRANC. DA P. Giovedì 2

Belirio acuto

I Sp. Bell' idrato di cloralio gram. tre
 sciroppo febaico gram. trenta
 acqua di menta gram. cento
 d. da consumarsi in quattro prese

II Bell' uretano gram. da uno a tre
 sciroppo di fiori di arancio gram. quindici
 acqua di tiglio gram. quaranta
 d. da prendersi in una volta

Ricerca di vermi con l'analisi dell'urina
 A 10. c.c. di urina la recente emessa e scal-
 data all'ebollizione si aggiungono 10
 gocce di una soluzione di nitrato mer-
 curico. L'urina normale diventa lat-
 tescente e rapidamente deposita un pre-
 cipitato bianco; invece se vi sono ver-
 mi fasciati o ossiuri. Tenuta nell'urina ap-
 pare una colorazione grigia scura, che
 può arrivare al nero - sempre che il sog-
 getto non abbia preso alcun medica-
 mento nei due o tre giorni precedenti.

VICHY-CÉLESTINS

GOTTA
DIABETE
RENELLA

3 Venerdì

S. IDA

APRILE

S. ISIDORO

Sabato 4

Dolori colici da eccitamenti nervosi

Sp. infuso di valeriana 5% gram. cento
bromuro sodico e potassico da gram. tre
cloridrato di morfina ed estratt. di belladonna in can. cinque
sciroppo di cloro gram. trenta
acqua di lauroceraso gram. cinque

Un eccubio ogni mezz'ora fino alla
enterite acuta latente calera e fino a 5 o 6 Dasi.

bismutose
gr. 15
masticine gomma
gr. 25
acqua sterile
gr. 100
un eccubio
da caffè ogni
mezz'ora

Enterite pseudo membranosa
fiala di emetina n. 4
iniezioni intramuscolari

Emuresi o incontinenza d'urina
a) alimentazione più vegetariana che con carne
b) evitare la fofica e gli straparri, o sia all'aria aperta
c) impacchi con turpola bagnata in acqua fredda e
avvolgimento in coperta di lana calda
al momento di coricarsi dare al bambino in acqua
zuccherosa cinque gocce di un centesimo
di atropina in gram. dieci d'acqua bollita
eumentandi di una goccia al giorno fino
a quattre quintici, sospendendo se appare di
latarizone della pupilla o secchezza della gola
Dalla sera l'insufficienza è anche diurna una
mattina, mezzogiorno e sera da una goccia
e cinque per volta, senza oltrepassare quattre

enterocolite
citrato sodico
gr. uno
fosfato sodico
gr. mezzo
solfato sodico
centi ventidue
inf. c. una
un'ora prima
del pasto due
o tre volte al giorno

TOSSE — PASTIGLIE PANERAI

Malattie dello
Stomaco e degli Intestini

VICHY-HOPITAL

7 Martedì

B. ERMANNO

APRILE

S. DIONIGI

Mercoledì 8

Sodioformio e acido salicilico comb. in 25
 , otto nitrato di bismuto comb. in 25
 glicerina borica e glicerina pura in 10
 unguento esterno

il secondo si copre con latta e si fascia.
 All'indomani si disfa la fasciatura.
 se vi è ancora piressia persistente si
 tochi con la soluzione di nitrato di ar-
 gento e si passa il catrame, se poi
 non vi è più si passa il solo catrame.

Del 3° stadio (eczema torpido)
 se non vi è tensione dolorosa, né ede-
 ma, ma semplicemente un po' di ros-
 sore e di essudato, si tocca la parte
 con soluzione di nitrato di argento
 cristallizzato 1:10 e si copre con pa-
 ssa di ossido di zinco.

E se l'eczema non mostra segni di pro-
 gressiva guarigione, si applichi
 sulla parte di ossido di zinco e di latta in gram. venti
 olio di mandorle dolci e di cade in gram. dieci

E se il nitrato di argento è mal tollerato, si usi
 (a bis) acido picrico gram. uno
 acqua distillata gram. cento

10) oppure olein di metilene gram. uno
 acqua distillata gram. cento

E se l'eczema è secco, si aggiunge catrame,
 o idrolo di tumentale.

11) retubizzazioni di epite con
 resorcina gram. cinquanta
 acqua distillata gram. duecento cinquanta
 internamente se ne applica un unguento di metilene

ESTRATTO PANERAJ

IL MIGLIOR PREPARATO
DI **CATRAME**

9 Giovedì

S. DEMETRIO

APRILE

S. POMPEO

Venerdì 10

III Lavaggi con
 salicilato di soda gram. cinque
 Decozione di foglie di rosa gram. cento

IV Vanilline flav. di confetti
 Per la cura di tosse via che si dà per
 la cura della difilide a pag. 178

V
 Vasettina } ossido di zinco gram. uno
 } acido salicilico gram. mezzo
 } amido gram. quattro
 } ^{gr. venti} ^{olio cent. sessanta} ^{olio, amido} biscolzare l'ossido di zinco, l'acido salicilico
 di zinco e col } e l'amido con acqua distillata e poi si
 tonitrate di bi } mescola bene con la vasettina e l'olio di mandorle
 muso } si passa sotto la parte ammucchiata con un
 } ca. gr. due } lino dopo l'elaborazione

VI **Dermia-Plastol Eumesnil**

flav.
 secondo istruzioni a stampa

VII nell'eczema locale e congiuntivite cadaveriche
 binerato di soda gram. due acido salicilico cent. dieci
 aq. distillata gram. cinquecento: lavaggi disposti s'ibecca due
 3 volte al giorno tenendo il cotone per 5 minuti sulle palpebre chiuse
 e quindi istillare il 2 gomme di protargolo contige. venti a un
 distillata gram. sette e ciò per 10 giorni e per altri 10 giorni
 il decotto di ammonio e solfo-fenato di zinco a cent. cinq.
 aq. distillata gram. 15 e ad indi si ritorni al primo collirio

ESTRATTO PANERAJ

contro i **CATARRI**
CRONICI E ACUTI

13 Lunedì

S. ERMENEG.

APRILE

S. TIBURZIO

Martedì 14

Emicrania

I dell'antipirina gram sei
caffèina gram uno
acido citrico centigr. dieci
m. ef. c. N.° venti

I. Due a quattro con merzorio 2° intervallo

II dell'indolteranza dell'antipirina
dell'aspirina gram quattro
piramide e caffèina id gram una e mezza
m. ef. c. N.° dieci

I. Due con intervallo di un'ora

III del piramide centigr. novanta
caffèina centigr. sessanta
m. ef. c. N.° sei

I. Due a tre con intervallo di un'ora

IV alla prima manifestazione dell'acuto

liberizzato
di chinino
gr. due
piramide
e in terzina
gr. uno
m. ef. c. dieci
L. mattina e sera
una

dell'antipirina e bromuro potassio in gran
dissoluto di cocaina centigr. uno
caffèina centigr. quattro
pentina centigr. trenta
m. ef. c. cachet

V valerianato di chinino gram due

VI. big
nucleo ferrina
partiglia 20
gr. uno e mezzo

piramide gram uno e mezzo
Carbonato di litina (negli artrosi) gram cinque
m. ef. c. dieci mattina e sera uno

caffèina centigr. dieci mattina e sera uno

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

15 Mercoledì s. ANNIBALE APRILE s. CALLISTO Giovedì 16

Encefalite letargica (malattia del sonno)

Sanguisugio ai processi mastoidei
vescica di ghiaccio sulla testa, iniezioni
di stricnina ed energici purganti dolo-
si e salini / olio di ricini - solfo di soda.

nti 1^o
nicipela c,

Emorroidi

I Pillole antiemorroidarie Gattori

II Sedafillina centigr. sessanta
estr. matto di belladonna centigr. diciotto
m. sp. p. n. 6.
una la sera prima d'andare a letto

III Sp. fiori di zolfo subl. centigr. venti
ra. barbarso palv. — centigr. dieci
cremor. di tartaro e bicarbonato sodico a centigr. quini
palv. di Lawer centigr. dieci
m. sp. la sera prima d'andare a letto

IV Polvere di rabarbaro e di saba persica ungr. mas
fiori di zolfo subl. centigr. quaranta
estr. di belladonna centigr. due
m. sp. la sera prima d'andare a letto

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

17 Venerdì

S. ANICETO

APRILE

S. GALDINO

Sabato 18

I epistaxis emorroidi sanguinanti
si zoffi la narice con cotone imbevuto
di olio essenziale di Eucalipto

I o con soluzione di antipirina

enuresi notturna
I fiale di ipofisina sub.
iniettioni intramuscolari

II edema renebrale
impacchi caldi umidi di soluzione
di biclorato sodico 1%

I Milticidia sanguinea emorragica
soluzione di adrenalina 1%, colorata
di cocaina e estratto di belladonna
aa centig. otto.
con burro di cacao cf. suppositori n. 11

II porota adeno-stiptica Midy

III suppositori adeno-stiptici Midy e pure
estratto di belladonna e tabacco aa cent. uno
antipirina centig. quaranta
soluzione di adrenalina 1% goccie venti
burro di cacao gr. tre.
I suppositori: si ripeta ogni sera

10 Centesimi il pacco
per un litro d'acqua

SALE VICHY-ÉTAT

19 Domenica s. CRESCENTINO APRILE

S. SULPIZIO

Lunedì 20

Concessione

I Sp. Sulf' acetato di piombo centigr. trenta
rasura di oppio centigr. quindici
m. ef. c. n. cinque
d'una ogni tre ore fino ad effetto

II Sulf' acido gattico gram. tre
m. con ergotina q.b. e f. pillole sei
d'una ogni due ore

III Sulf' estratto fluido di viburnum pruni
folium e di hydrastis canadensis
ãã gram. dieci
d'una ogni quattro ore

IV nei bambini
Sulf' allume polverato gram. mezzo
acqua di chabel goccie venti
estratto di rasanca gram. due
scirop. di rose e di acacia ãã gram. trenta
infuso di rose rosse gram. cento sessanta
d'un cucchiaino di dessert ogni mezz'ora

V Sella dipticina centigr. dodici
f. c. n. sei
d'una ogni quattro ore negli adulti
nei bambini un centigr. ogni 4 ore

VI della soluzione di adrenalina al 1% gr. due
d'una ogni cinque ore

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO
INALTERABILE

21 Martedì

S. LAURA

APRILE

S. VIRGINIO

Mercoledì 22

Cresipela

I. *Op.* della tintura di iodo gram. venticinque
guaiacolo gram. cinque
alcol rettificato gram. trenta

Il pennellare una volta al giorno fino
al di là del margine arrossato di seppi
e incomincia la desquamazione della parte.

II della glicerina gram. cinquanta
iodoformio polv. gram. cinque
d'uso esterno

III dell'olio essenziale di fermentina gram. trenta
iodoformio polv. gram. tre
d'uso esterno

IV con lapis di nitrato di argento bagno
vasebraghi. Inteso lo mett'acqua si circonda la parte
stato gr. cento } gonfia e arrossata fino a centimetri
alido di zines e } Que della regione sana per una volta
della nitrate di bi } volta, e si ricopra la parte, così
smalto an. gr. sei } bagnata con cotone peristato.

V (a) si distende con un piumaccio di ovatta
(empiricamente) dell'acido fenico al 95% sull'area in
cassa di tabacco e vasa e su un centimetro di pelle sana
sangue di crista e giallo intorno: al colore rosso della pelle arden
non completa mai tra il bianchiccio. Le però l'area affetta
l'una e usa è vasta, va trattata così solo in parte.

Durante i pasti
bisogna bere la

VICHY-CÉLESTINS

23 Giovedì

S. GIORGIO

APRILE

S. FEDELE CAPP. Venerdì 24

(6)
 iniezioni di Zimargolo e nel caso anche di diaconforato.

Terminato il 1° tempo, il 2° tempo consiste nel passare sopra la parte bianca di una piumaccia imbevuta di alcool. Non sono escluse dalla medicina pura le mucose, le palpebre, le ali del naso ecc. Nei soggetti molto giovani possono avervi insuccessi, e segni di assorbimento di acido fenico.

In generale è sufficiente una sola applicazione; la cura ulteriore consiste in diluizioni saline o lievi soluzioni feniche.

VI

acido fenico puro e canfora rosa aa gr. sessanta
 alcool assoluta gram. venti
 mescolati in un bicchierino

Si pennellatura più volte al giorno
 serve ancora contro il flemmore, che dopo
 la pennellatura segue un impuro caldo.

VII

Vasellina pura gram. trenta
 iltiolo gram. tre

Si applica sulla superficie erisipelata con
 molle al grosso e si copre con un molla.

VIII

Tintura di iodo e alcool edilico rettificato aa gr. trenta
 guaiacol cristallizzato gr. tre

Si pennellare ogni giorno tutta la zona erisipelata
 sia sorpassando alquanto i margini.

In 5 o 6 giorni si avrà la defervescenza e la disquamazione.

SCIROPPO PAGLIARI

Purgante Comodo
Efficace - Sicuro

25 Sabato S. MARCO EV. APRILE S. MARCELLINO Domenica 26

Faringite

I Sp dell'acqua coccolata di lauroceraso gram trenta
 clorato di potassa pulverato gram dodici
 acqua distillata gram duecento
 d. polverizzazioni

II solificato di soda gram cinque
 mentolo gram uno
 salato gram tre
 alcool gram cento
 un cucchiaino in un
 bicchiere di acqua
 per polverizzazioni
 limonata cloridrica a piccante aci-
 dilata gram duecento
 d. polverizzazioni tre volte al giorno

III tintura di iodo gram cinque
 glicerina gram dieci
 permanganato
 Allume q. 15
 Cloreto di potassio
 mezzo litro di acqua

IV netto dalla cronica
 V tipo del benzato di soda gram due
 cloridrato di cocaina centigr. venti
 mentolo centigr. cinque
 alcool puro gram dieci
 acqua coccolata di lauroceraso gram ven-
 tiquattro
 acqua distillata gram centoventi
 d. polverizzazioni due volte al giorno

VICHY-HOPITAL

AFFEZIONI DELLE
VIE DIGESTIVE

27 Lunedì

S. ZITA

APRILE

S. VITALE

Martedì 28

V
 del carbonato neutro di sodio gram due
 acqua di lauroceraso gram cinque
 acqua distillata gram duecento
 di polverizzazioni quattro volte al giorno

VI
 dell'acido lattico gram due
 acqua di lauroceraso gram cinque
 acqua distillata gram duecento
 di polverizzazioni due volte al giorno

VII
 del mentolo centigr. venticinque
 olio di vasellina gram venti
 di medicatura nel naso con un pennello
 due volte al giorno.

VIII
 dell'acqua distillata gram venti
 nitrato di argento cristall. centigr. quarant
 di in bar. oscura
 di per mettere nella gola una volta
 al giorno.

IX
 faringite cronica granulare
 dell'acido fenico gram mezzo
 iodio in pastiglie gram uno
 ioduro potassio gram due
 clorido corallo gram tre
 glicerina neutra gram cinquanta
 di per ingestione due volte al giorno

PASTIGLIE PANERAJ

IL MIGLIOR RIMEDIO
CONTRO
LA TOSSE

29 Mercoledì S. ROBERTO APRILE S. CATERINA Giovedì 30

Foruncolosi

1. I foruncoli sono rammoliti e percorsi sopra e intorno ai foruncoli nelle più le circostanze con tintura di iodo, in di si applica una compressa di garza ricoperta con vasellina ittialata / word lina gram cento ittiale gram dieci / si sovrappone cotone idropilo e si benda. Il giorno dopo si mette la regione del pus seccata, e si asciuga con tamponi imbevuti di benzina, e si ripete la medicatura col iodo e vasellina - e così di seguito fino a che il pus non è esaurito. A questo punto si sospende la tintura di iodo onde evitare irritazioni follicolari, e si prosegue la medicatura con vasellina ittialata o meglio con ittiale puro.

2. La perdita di sostanze è forte, si affretta la formazione dell'epidermide con la seguente pomata: nitrolo di argento cristall. gram uno balsamo del Perù gram cinque lanolina gram cento.

Quando il foruncolo è ormai duro si pratica una energica puntellatura con tintura di iodo. Dopo si applica subito con un pennello o con un batuffoletto di cotone mar

Riassunto di APRILE

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27	11			
28				
29				
30				
Totale				TOTALE

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA TOSSE

1° Venerdì S. GEREMIA PR. MAGGIO

S. CESARE

Sabato 2

Fare *Immunamente venoio!*

impacchi Il fango si incide a croce e profonda circa
collo ungh. si sprema forte da cacciare tutto il pus
con soluzione ana. cas. facile settici nelle loro ulcione
Fac. D. feris ramificazioni cervice dal bisturi
4% *ripet.* si pratici in un generoso lavaggio
linguista con schizzello di vetro con iodo-benzina
avola notte nel fondo della ferita, così d'attentana
al 1° periodo re il sangue ed il pus, addentandosi
infiammazione il più profondamente possibile nei di
Il foracori verticali non raggiunti dal bisturi
si amallise infine tamponamento con garza io
e si apre al beverolo di iodo-benzina e fasciasu
in seguito da iodo-benzina si prepara sul seguente
do di impachi modo
si praticano si versa in un dato volume di benzina
inazioni di un poco di tintura di iodo e si agita.
4 *si rinvia* La iodo si scioglie fino a saturazione,
soluzione fini dando alla benzina un color tilla e
cala 4.00 in l'eccesso di tintura iodica precipita
come al forchi al fondo.
centide metri
da e sera, ecc. Così la iodo-benzina si mediano a cor
si si pratica delle le ferite infette e della cute
nei giorni *Gospaluria*
guenti, fino Il carbonato e benzoato di litina in parti cinque
a che la cav bicarbonato sodico gram. trenta
fa diventa fosfato bico di ossigeno gram. sessanta: in colla in
netta di canif un malisio in mezzo litro di acqua per base
nella giornata

PASTIGLIE VICHY-ÉTAT

Preparate coi
Sali Naturali

3 Domenica

PATR. S. GIUS.

MAGGIO

SS. SINDONE

Lunedì 4

Gastralgia

Bromuro di potassio gram. Dieci
 " " di sodio gram. sei
 " " di ammonio gram. quattro
 acido fenico cent. venti
 Liquore di Fowler gram. Due
 Ossidato di caccao tintura di ginseng gram. sei
 Inf. di Scorz. di scorze di arance amare gram. cento
 Aq. bellita e cacao acqua distillata gram. Duecento
 An. gr. Dieci, una cucchiata da zuppa in mezzo bic
 Indici gomme in schiere di acqua prima di ciascun pasto
 per acqua

II se i disturbi dello stomaco dipendono da
 tintura di e seuer ostensio - isterismo e ipotonia gastrica
 stratto di oppio con ipocrito catarro della mucosa gastrica
 gr. cinque in uso la pepsina-proteasi Dell' Istologo
 n. di colombo per terapia milanese con cucchiata
 gr. quindici da caffè dopo ogni pasto
 n. di radiana gr. Dieci

D. sette giorni prima
 III se vi è gonfiore di stomaco e pirozi

III Fosforo di calcio gram. cento
 magnesio calcinato gram. quaranta
 carbonato di calcio gram. venti
 da un cucchiata di caffè prima e dopo il pasto

IV
 magnesio solfo e bicarbonato sodio gr. sei
 carbone di bette gram. cinque
 urotropina gram. quattro
 f. u. 90 - 100 al giorno prima del pasto

ESTRATTO PANERAJ

IL MIGLIOR PREPARATO
DI **CATrame**

5 Martedì

S. PIO V.

MAGGIO

B. VIOLANTE

Mercoledì 6

Gastralgia

I (a) Sp. del liquore di Hoffmann. Tinctura di
badiana e di rabarbaro ca. gram tre
tintura di noce vomica gram una
I. In dieci a quindici goccie avanti il pasto

(b) Laudano e cloroformio ca. gram venti
balsamo del Fioravanti gram ottanta
I. frizionare leggermente la regione epigastri

II (a) Bagni tiepidi prolungati e Lievi. Sali
di polibromuri / non morfina od eroina.

(b) estratto di cannabis indico. contig due
di pillola una
I. avanti di ciascun pasto una pillola

(b bis) oppure
bromuro di stronzio gram venti
acqua distillata gram trecento
I. due ucchiati dopo ciascun pasto

III Nelle crisi gastriche che intervengono

IV nel corso della dose si dia dopo ogni
iniezioni di $\frac{1}{2}$ posto una ucchiata

adrenalina 4% di nitrato di soda gram due
di 1 cm² nitrato di potassa gram dieci
bicarbonato di soda gram venti
acqua distillata gram trecento

RENI
VESCICA

VICHY-CÉLESTINS

7 Giovedì

S. STANISLAO

MAGGIO

S. VITTORE

Venerdì 8

IV Quando vi è difetto di acido cloridrico nel
 sullo gastrico (ipocloridria)
 (a) 50 cent. acido cloridrico gram. mezzo
 sciroppo di limone gram. cinquanta
 acqua distillata gram. trecento
 da un bicchierino mezzo o un po' di ogni pasto

(b) cura tonica.

V Quando l'acido cloridrico è in eccesso
 (ipercloridria)

(a) salicilato di bismuto cent. trenta
 creta preparata gram. uno
 bicarbonato di soda gram. due
 m. prima di ogni pasto
 oppure

VI solfato e fosfato di soda in gram. cinque
 bicarbonato di soda gram. dieci
 acqua distillata gram. mille
 da un bicchierino prima di ogni pasto
 da evitare gli acidi

VII Quando vi è piroli e sviluppo di gas
 (a) del salicilato di bismuto creta prepa-
 rata e bicarbonato di soda in gram. dieci
 salolo gram. quindici
 m. cf. cristine N.° trenta
 da una prima di ciascun pasto evi-
 tando gli acidi

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

9 Sabato

S. GREGORIO

MAGGIO

S. ANTONINO

Domenica 10

oppure (b) carbone condensa gram. dieci
 magnesio calcinato gram. cinque
 m. q. carboni n.° venti
 d'una prima di ciascun pasto

oppure (c) un bicchiere di acqua cloriformica seque
 Il lit. se intervengono dolori
 liquore di Hoffmann gram. dieci
 laudano gram. cinque
 d'venti goccie tre o tre ore dopo i pasti

N.B. da mancanza di acido cloridrico nel
 succo gastrico indica degenerazione
 del tessuto epiteliale in tessuto connettivo
 Gre in luogo di acido cloridrico si tro-
 va acido lattico è indizio di neoplasia
 L'urea normale nell'urina è 18%
 se trovasi in diminuzione vi è in-
 sufficienza epatica.

IX. Nell'ipercloridria con vertigine gastrica
 (a) una bella limonata di mattina e di sera
 (b) Durante i pasti un bicchiere d'acqua minerale
 (c) Dopo i pasti infuso di camomilla calda una tazza
 (d) evitare burro cotto, grasso, salse, frullate, fo-
 maggi, caffè, the, tabacco.
 (e) mangiare carne arrostita, legumi cotti in acqua

Dopo i pasti
DUE o TRE

PASTIGLIE VICHY-ETAT

facilitano
la digestione

11 Lunedì F. FONZIO V. MAGGIO S. PANCRAZIO Martedì 12

- con sale ed un po' di burro fresco
- 16/1 al mattino appena alzato mezzo bicchiere
d'infuso a freddo di gram. una e mezzo di fe-
gno quassia
- 17/1 dieci minuti prima dei pasti dieci gocce
di tintura di rose vernice in acqua
- 18/1 un ora dopo i pasti in acqua una cartina
di bicarbonato di soda e magnesio idrata in g. otto
lattosio e carbonato di calcio precipitato in g. sessi
f. c. d. ventiquattro
- A. b. si continuano le cartine per otto giorni
si sospendono per quattro e si ripigliano
per quattro giorni

1 Al momento dell'assunzione di vestigine
serpentaria virginica gram. una
camphora ed ossa fetida in gram. mezzo
estratto sebaco centig. cinque
sciroppo q. b. per 24 boli
d. due a cinque al giorno

19 oppure più semplice, al momento dell'assunzione
bromuro potassico ed oz. di lucrezza in g. sei
sciroppo di etere gram. trenta
idrolato di valeriana gram. centosessant
d. tre cucchiaini al giorno

20 carbonato di calcio gram. una e mezzo
fosfato di calcio e magnesio in centig. sessanta
polvere di belladonna centig. sei
f. polveri 3. una ogni quattro ore in nero

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO
INALTERABILE

13 Mercoledì

S. GEMMA

MAGGIO

S. VITTORE V.

Giovedì 14

Betoni

I
Primo delle ulcerazioni per varicella
opp. della tintura di iodo e di oppio in gress con
glicerina gram trenta

II
Tintura di iodo gram dieci e quindici
glicerina gram trenta

III
Thiogenol gram uno
lanolina gram dieci

IV
olio camforato gram uno
lanolina gram dieci

V
resorcina, lannina e thiogenol in gram due a
acqua distillata gram dieci a cinquanta

VI
Bagni caldissimi della parte arrossata
con decozione di foglie di noce o di
sorbo ed aceto

Se vi sono ulcerazioni si possono
ricoprire con una spessa strato di catene colle
mugli di grasso uovo nitrato di argento misto
o di balsamo di Peris, o di Thiogenol, o di balsamo
con gram duecento di acqua, o di acido fe-
nico con gram duecento di linimento oleo
calceoso per comporre con gram cento olio di
uliva e gram cento acqua di calce ed altri per ac-
(linimento)

Non dimenticare
di indicare chiaramente

VICHY-ÉTAT

nel prescrivere le Acque
ed i Prodotti di Vichy

15 Venerdì s. TORQUATO MAGGIO s. GIOV. NEP. Sabato 16

VII

X
caustico in empu
alcool ed olio glicerina
glicerina gran. verdi
glicerina
glicerina

Prima che avvenissero ulcerazioni
lavata la parte gonfia, dusa ed arrossata
con acqua calda saponata, la si immette
ge per dieci minuti in acqua calda cal-
da che si possa sopportare, si asciuga
e si spessimela largamente con il liquo-
re di Kowalski / acido nitrico gram. uno
acqua sterile gram. cento / si lascia se-
care senza asciugare e si spessimela una
seconda volta si ripete la cura due
line e se a prima di alzarsi e pra-
ma d'andare a letto. I dolori cessa-
ranno in capo a due giorni e la
guarigione si avrà in 6-8 giorni.

VIII

XI
acido borico 3.00
" bórico 3.00
aq. destill. 30.00
glicerina
glicerina

avverto l'ulcerazione
ip. antipirina gram. cinque
acido bórico e salolo an. gram. tre
iodolo ad. acido fenico an. gram. uno
sublimato corrosivo centig. dieci
varillina an. gram. cinque a dieci
si immerge la parte piagata per pochi mi-
nuti in acqua a 50° e poi si galera la so-
luzione e si ripete con garza e cotone

IX

XI
acido salicilico gram. uno
tintura di iode gram. otto

acube sana ep. glicerina gram. quindici
acido fenico gram. mezzo
acido salicilico gram. uno
tintura di iode gram. otto
- l'ammortatura matita e rosa

SCIROPPO PAGLIARI

Purgante Comodo
Efficace - Sicuro

17 Domenica

S. PASQUALE

MAGGIO

S. FELICE

Lunedì 18

1 (a) Pozzo fotticava o ipostrofico scaplie
 Belle giade di endospermio della S. S. S. S.
 siero-terapio milanese n. 36
 di iniezioni ipodermiche una al giorno

(b) glicerina gram dieci
 iodofornice gram uno
 pennellare mattina e sera sul pezzo e in
 cupra con cotone idrofilo

(c) oppure per pennellare come sopra una al giorno

(d) di olio essenziale di terebintina quattro
 compresse di tiroidoformio gram due
 idina Zambelletti 2 per bocca
 di dieci compresse acqua distillata gram cinquanta
 al giorno per 15 giorni
 ioduro sodico gram venti
 iodato metallico centigr. trenta
 per una settimana da un'ora a quindici giorni la mattina
 poi ripetere il tutto non si usi questa ultima prescrizione oltre
 la cura per altri 15 giorni perché abolisce la secrezione latte

II
 capsule di } detto Iodio gram quattro
 di iodio Astier } vasolina gram ottanta

La capsula si frizionare leggermente due volte al giorno sul
 dopo i pasti la pelle del groin quanto un pisello di un'ora
 Zambelletti

III
 Endotrisidina fl
 due compresse al giorno e per
 parecchi mesi

giornale di Sciarzone

COMPRIMÉS

dell'idrocele essenzi
n. 17. 1926.
essenziale

AT

Servono a prepararsi da
sé l'acqua alcalina ga-
sosa.

Molto economici.

19 Martedì S. CELESTINO MAGGIO S. BERNARDO Mercoledì 20

Gingiva...
 In parte di china di cassia e acido tartarico
 aa gr. due
 Si prepara dalla parte sottile...
 con colore imbevuto in
 si aggiungo di mirra e di rosmarino
 aa gr. cinque

Garofani
 Candrex
 Can.

... presso King Bull
 Galleria Umberto I. Napoli

Procedimento

con un'acqua...
 ti sottile si svuota la cavità ar-
 ticolare e quindi si istilla in detta cavità una
 e due fiale di argenteo colloidale...
 in fiale da 5 cc. cinque...
 un giorno...
 eventuali...
 con apparecchio...

GIUCCE JODO-FE
Soluzione titolata inalterabile
di acido
L. ROSE PAGLIARI

21 Giovedì ASCENSI, N. E. MAGGIO S. GIULIA Venerdì 22

Idrocete vaginale

Se il liquido è in poca quantità

I Sp. del sapone verde gram. cinquanta
iodo metadico gram. cinque

si spedisce un sottile strato su tela di
lino e si avvolge la porzione di secolo
gampata: si lasci fino a solidazione

II

Se il liquido è in quantità maggiore si
proceda ad operazione con le norme seguenti

Suberso la parte dove dovrà eseguirsi la
puntura, si pennelli con tintura di iodo

indi s'infizza un trequarti / 3 millime
tri di diametro / e poco al di sopra di es

so un ago di siringa Trauvarz. Si sva
to di due terzi circa il liquido della

borsa dell'idrocete, si ritiri il tre
quarti, ed attraverso l'ago della si

ringa s'iniettano 2 a 4 centimetri
cubi di una miscela a parti uguali

di formolo - alcool e glicerina,
facendoli colare questa miscela

gocciola a gocciola in tutti i sensi per
ben mescolare il liquido iniettato con

quello rimasto nella borsa. Si ritiri l'ago
si faccia un leggero impostamento sullo

secolo, e si protegga la puntura con collodion
100 gram. due di soluzione per idrocete di gram. 2

3 leggeri fusti re divi terminano in una rubin

VICHY-CÉLÉSTINS

NOTTA
DIABETE
RENELLA

23 Sabato

B. EMILIANA

MAGGIO

M. - AUSIL.

Domenica 24

115

L'infossatura tre quarti di 3 mm. di diametro e per 2 o 3 centimetri nella parte opposta alla posizione del testicolo; si tiene ferma con la sinistra la canula e con la destra si ritira dolcemente il liquido; il liquido scola e presso si toglie la canula e l'epididimo; se il liquido si arresta, si muovono alla canula con leggeri movimenti. al punto lo sciolgono e inietta per la canula si ritira in sito una soluzione di cocaina (10 a 20 mgr. di alcaloide). dopo pochi giorni, evacuata questa soluzione, si inietta 20 cm³ di liquore puro di Van Linné che provoca moderata reazione. Per un o due mesi si inietta per la canula del testicolo e dopo si evacua il liquido per la canula subito ad iniettarlo per la seconda volta, eccezionatamente si pratica la terza iniezione. dopo si evacua l'ultimo liquido e si ritira vivamente la canula chiudendo l'orifizio della puntura con un impiastro adesivo o colla d'oro. Non resta che tenere lo scroto chiuso con un bendaggio di flanella a T, ben serrato, e applicato sul perineo un voluminoso tamponcino di ovatta che impedisce ai testicoli di scendere al 9° o 3° grado vi è una infiammazione che termina completamente in 3 o 4 settimane.

BIOGEN

ti, Diarree
dei vecchi

Terapi

Rigeneratore dell'energia

FISICA E MENTALE

SANICI

25 Lunedì

S. URBANO

MAGGIO

S. FILIPPO NERI Martedì 26

Impetigine

(a) come cura interna sciroppo di ioduro di ferro iod

(b) dell'acqua di Atibour c'è
solfato di zinco e di rame à gram. quat
comparsa gram. uno
zafferano centigr. venti
acqua distill. gram. centocenti

d un cucchiaino di sale azur in quat
tro a dieci di acqua bollita per lavaggi

Indi applicare

(c) ossido giallo di mercurio gram. mezzo
olio di cade gram. uno a tre
cerotto senza acqua gram. venti
oppure

(c. bis) olio di cade gram. quattro
olio di mandorle o di ulive gram. ve

(d) della vasellina gram. venti
mentolo gram. uno
uso esterno

Malattie dello
Stomaco e degli Intestini

VICHY PITAL

27 Mercoledì VENER. BEDA MAGGIO s. ISIDORO Giovedì 28

Impotenza

Quando non è molto progredita
 / bel solfuro di zinco centigr. trenta
 estratto di nore vanica gram. uno e mezzo
 in con gomma adragante cf. pillole di ...
 per i primi dieci giorni una pill.
 quindi mattina e sera una di
 assoluta della donna - e di voglia.

II Stricnina e fosforo ca gr. 0,012
 estratto di conape indiani centigr. 2
 ferro purificato gr. due
 polv. di vanillato centigr. quarant
 e diviso in 25 parti
 / tre al giorno una prima di ciascuna parte

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ANTICOL”

29 Venerdì S. MASSIMO MAGGIO S. FERDINANDO Sabato 30

Influenza

I
 Ip. delle foglie di Saborandi gram. quattro
 f. inf. a calde a colatura di gum. cerberina
 benzato salic e liq. am. l'ammonia in gram. due
 salicilato di sodio gram. quattro
 op. di cannella gram. cinquanta
 sciropp. di scorze d'arancio amaro gram. trenta

d. due cucchiaini all'ora da sospendere ad
 apparire del sudore o scitarrea/saliva etc.

Quando per influenza appare uno stato
 depressivo nei bambini si dia

II
 o
 acetato di ammoniaco gram. due
 tintura di cannella e di Kola in goccie dodici
 sciroppo di menta gram. trenta
 " " di gomma arabica gram. ottanta
 d. un cucchiaino da caffè all'ora

III
 Quando è da sospettare un'insufficienza renale

Ip. del biosurrenal. f. gr. venti
 f. dieci goccie ogni due ore, a quindici ogni tre ore
 o venti ogni quattro ore -

(Il biosurrenal. si trova allo Istituto sperimentale Nazionale di Pisa
 con predominio di fatti gastro-intestinali
 micr. coli di gram. uno di colore rosso
 e cremor di latte gr. 300 sale e l'aspir. di g. nere
 acqua gr. 350 sciropp. di limon. gr. 50 ed ogni ora)

Per impedire le FRODI

e le sostituzioni bisogna aggiungere sulle ricette alla parola VICHY il nome della Sorgente.

31 Domenica

PENTECOSTE

MAGGIO

Memorandum

Prostatale con lenismo e frequenza delle miczioni

I. Bizamidone gr. due

f. c. n. otto

Uso due al giorno prima del pasto

II. Elmitolo gr. dieci

f. c. n. 10

Uso in mezzo litro d'acqua da consumarsi nella giornata

Incontinenza di urina dei bambini

Volta ad aria libera calma soggiorno in campagna ad in vista al mare: alimentazione prava

fruttifera vegetariana, senza cibi aromatizzati e bevande

fredde e la sera nell'andare a letto, un

cucchiaio di caffè di acqua zuccherata

con 12-15 gocce

I. Di solfato di atropina centigr. uno
acqua sterile gr. dieci

Laumentando di una goccia ogni sera fino a 15-20 gocce quindi 20-25 gocce per

il. Di non rispondendo allo scopo si passi da seguente

II. acido fosforico officinale gr. diciassette

fosfato di sodio gr. trentaquattro

acqua distillata gr. duecentocinquanta

Uso un cucchiaino da caffè tre volte al giorno

Riassunto di MAGGIO

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1				
2	I	Sperchloridria		
3	"	fenomeni comuni		
4		spesso calmano con la routine, gola secca - bruciore alle stomac.		
5		punture ai punti delle tavolette		
6			Perroud N° 15	
7		Ad ogni tavoletta	contiene dieci divisioni	
8		o regoli, ed ogni divisione contiene un		
9		grammi di	carbonato di bismuto	
10		da 6, 8 fino a 10	regoli in una sola volta	
11		immediatamente	prima del pasto di mezz	
12		giorno all'acqua	o al latte, e per 8 a 15	
13		giorni; diminuire	senza scendere al di sotto	
14		di 4 regoli al giorno	per altri 15 giorni.	
15				
16		Ad. Tale cura è per	i soli ricchi, poiché ogni	
17		tavoletta costa L. 5,	e si trova presso il	
18		concessionario per l'Italia Sig. G. An-		
19		grisoni e C. Via	Del Pratellino n. 7 Firenze	
20				
21	II	Sell'az. ossigenata	pura gram. venti	
22		citrato di soda	grammi uno	
23		acqua distillata	gram. Duecento Hanla	
24				
25		Ad un mesticcio in	tre quarti di broccione	
26		di acqua tiepida	il mattino a digiuno, un	
27		altro verso le dieci	ed un terzo alle diciasette	
28				
29				
30				
31				
Totale			TOTALE	

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

1° Lunedì S. GRAZIANO GIUGNO S. GUIDO Martedì 2

	<i>Smalticidi</i>			
<i>cimici</i>	alcol Denaturato gram. cento			
	formalina gram. dieci			
	d. con un pannello si bagnano tutti i punti			
	vede di parassiti e delle loro uova			
	Giovane anca naphalina e la zuzia			
<i>putri</i>	31 un Describtor	medico	giovane	per le putri
	ed in duogo d' alcool si potrà usare l'acqua			
	stropinando i locali con uno straccio			
	fenduto nella soluzione facendo penetrare			
	il liquido negli interstizi del pavimento			
<i>pilobutria Idago</i>	olio e g.	trobis	a parti	uguali
	si strofini la testa e poi si copra con benda			
	da notte o con benda di tela sopra un'ora			
	si lava con aceto caldo, e poi una luo			
	na saponata calda e pulisce			
<i>p. delle vesti</i>	bisinfettore	le vesti con gas solforoso		
	per due ore bruciando gram. 30 di solfo			
	per un m. di ambiente, o con l'ebol			
	lizzire per mezz'ora: radere i peli delle			
	asciutti e strofinare il corpo e la gamba			
	mediciale con unguento napholite			
<i>p. del pube</i>	strofinare con aceto gram. cinquecento			
(a)	sublimato corrosivo gram. uno			
	oppure			
(b)	olio di uliva gram. sessanta			
	napholite gram. cinque			
(c)	oppure			
	unguento cinereo			

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA TOSSE

3 Mercoledì S. CLOTILDE GIUGNO S. QUIRINO Giovedì 4

Isterismo

I (a) menobromo di canfora e bicarbonato sodico. gr. cinque
 e abarbaro polv. gr. quattro
 m. f. c. dieci

La mattina e sera una in acqua.

(b) bromuro di potassio di stronzio e di ammonio. gr. tre
 ioduro di potassio gr. quattro
 acqua distillata gr. trecento

I tre cucchiaini al giorno con interruzione di quattro ore nella 1^a settimana, e quattro cucchiaini nella 2^a settimana.

(c) Siarsen valero-fosf. Wasserinnos. fl. uno
 di una cucchiainata a pranzo e una a sera.

II

bromuro di canfora centigr. Dieci
 valerianale di zinco centigr. cinque
 estratto di valeriana centigr. cinque
 " di oppio e di canape indiana. gr. uno

in tre pillole
 di latte f. di tre
 1^a 2^a e 3^a a tre al giorno

10 Centesimi il pacco
per un litro d'acqua

SALE VICHY-ÉTAT

5 Venerdì

S. BONIFACIO

GIUGNO

S. CLAUDIO

Sabato 6

Medicizia casarrale

I

olio di oliva gram. duecento
s. gram. cento al mattino un'ora prima del latte

II

(a)

calomelano a vapore gram. due
f. c. n.° venti una al mattino in una
cucchiaiale

(b)

di scizoppo di vic. rabarbaro gram. cento

III

Salicilato di soda e benzoato di soda a gram. quattro
rabarbaro polverato gram. uno e mezzo
potofillina e gel. di belladonna a centesimi quindici
m. ef. cathed. n.° dodici
s. tre a tre al giorno.

IV

Enda Epatica dell'istituto sieroterapico vichy
flac
s. sessanta gocce al giorno

ESTRATTO PANERAJ

contro i **CATARRI**
CRONICI E ACUTI

7 Domenica

SS. TRINITÀ

GIUGNO

S. MEDARDO

Lunedì 8

mastite / suppurazione della mammella

Del latte scremato e pollina per
dieci minuti 5 cmc.

linierazione nella natica a giorni al-
terni fino alla scomparsa del tur-
gore del dolore e del rossore della
mammella

Mugnetto

Soluzione di borace o di acido borico 2%

Ricerca di vermi con l'analisi dell'urina

Ricerca di ascari o di
altri vermi con la reazione
dell'urina

Si si riscaldano fino
all'ebollizione 10. cc. d'ur-
ina e si aggiungono 10
gmc di salafina di si-
trato di mercurio 22
si ranno vermi si avrà
una calongione aqua
ra o nerastra.

~~Ogni medico ha quotidianamente l'occasione di prescrivere i CRAMINO...~~

Durante i pasti
bisogna bere la

VICHY-CÉLESTINS

9 Martedì

s. CORINNA

GIUGNO

s. PRIMITIVO M. Mercoledì 10

Latte

I Per fare spicire la secrezione lattica
si ungono le mammelle con
essenza di menta e di bergamotto in glicerina
carifiora rosa gran due e mezzo
olio di ricini gran centodici

II S'impacchi il seno con foglie di menta

III nell'indolimento del latte - fermenti lattici
Lactosio - flac di pastiglie
C. G. Benvenuto e M. Gazzone - Torino
ricostituente

II Catequina Concetti - flac
S'usa un cucchiaio da caffè mezz'ora prima
del latte

III Eurymina menarini f
In goccie secondo l'età

IV a goccie 250 di latte vando bollito e raffreddato
non aggiungere g. due di caseo lattico

DIARRÉE DEGLI ADULTI — "ANTICOL"

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

11 Giovedì CORPUS DOMINI GIUGNO S. NAZARIO Venerdì 12

I: Messaggio cerebro-spinale
Siero anti-tif. n. virg. ucciso
A. per. iniezione endorachidea

II. Si fa parte e oscurato è il melado del strascotti
Subliminale corrosiva centig. 0,270
Siero artificiale gram. cinque
per una iniezione endovenosa in una
vanna ogni 24 ore fino al cadere della febbre
che al più si prolunga fino al 3° di giorno

Margherita

I. a) Iniezioni di siero antidifterico di 1000 ml.
per uno, due o tre giorni secondo il bisogno.
b) abbondanti lavande della cavità orale e
della disidrotomia con soluzione di bicarbonato
di sodio (gram. 25 in un litro di acqua sterile)
essendoci un polverizzato se di liquido
La detta soluzione si fa ogni 24 ore.
II. b. se le membrane con confluenza
rosse e tendono ad aderenti alla mucosa
si toccano con un batuffolo di cotone idrofilo
imbbevuto di siero antidifterico. Tale medica-
zione locale viene fatta quattro volte al giorno.
Il bambino potrà mettersi al petto, avendo
la precauzione di rivestire il capezzolo con
una tatterella di gomma bollita che verrà
cambiata ad ogni suckiata.

VICHY-HOPITAL

AFFEZIONI DELLE
VIE DIGESTIVE

13 Sabato S. ANT. DA PAD. GIUGNO S. BASILIO Domenica 14

Malaria

si toglia la febbre con insiezioni di biclo
riurato di chinina e dopo, per combatter
re il tumore di milza e presenze terri
cadute si usi

I (a) Sol sulfato di berberina gram. venti
clorurato di chinino gram. Dieci

Delle fide di Salomon
L'iniezione intra muscolari nell'emb
rimento post mortale
d'una al mattina un'ora prima della
colazione, ed una la sera un'ora
prima della sera in un bicchierino
di vermouth.

(b) col pranzo e con la sera in dieci a
venti goccie nel vermouth
di peptonato di ferro Robin

II (a) o meglio: delle pillole antimalariche Menge
di quattro al giorno con intervallo
di due ore, incominciando un'ora
dopo la colazione, e facendo il pranzo
un'ora dopo la terza pillola.

(b) peptonato di ferro Robin come sopra.

III (a) oppure
delle pillole di argichinina di A. Demart
di quattro a sei pillole al giorno.
Due prima di ogni pasto

(b) peptonato di ferro Robin come sopra.

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO
INALTERABILE

15 Lunedì SS. VITO E MOD. GIUGNO s. QUIRICO Martedì 16

IV (a) esanoflo Distesi: pillole

(b) perdonato di ferro trobia come sopra

Mixed empirici

(a) Per natura gravi tumori di milza =
cordemia di tipo selvatico e di nave
quando un polmo di mano, si lava
in molti punti con un chiodo e
si mette in infusione nell'aceto
per sei ore, dopo si applica sul
tumore splenico e si lascia fino
alla dissoluzione del viso bruciato.

(b) Vesicanti

(a) contro le febbri ostinate
polvere di foglie di eucalyptus con
cucchiaini da caffè in mezzo bic
chiese di vino generoso la prender
si per prima dell'accesso

(b) pillole di estratto di un miscuglio a
parti uguali di eucalyptus, assen
zia, mentourea, barkina, succo di
limone

V Filadine Chatelein

Mus

di due pillole al mattino due alla sera
serva ancora nel diabete e malattie del fegato e della milza
massime dopo di accessi di coliche epatiche

PASTIGLIE VICHY-ÉTAT

Preparate coi
Sali Naturali

17 Mercoledì S. ADOLFO GIUGNO S. FORTUNATO Giovedì 18

metodo per il pronto per la diagnosi di infezione malarica
Se con la punta del dito indice o medio della mano
Desta si esercita una moderata pressione a striscia
suo sul naso spazio interdentale sinistro, lungo
il tratto tra la linea ascellare media e la nasale, il
il prurito, quando è malarico, avverte una
sensazione di dolore, specialmente in combinazioni
del fronte o del viso.

VI Nell'infezione malarica acuta
china calisaya scelta gram. cinquanta
acqua distillata gram. mille.
fa decozione di ridursi a gram. cinquanta
e tolta dal fuoco si pongono per infuso
gram. cinque di foglie di eucalyptus
raffreddato in tuba si cola e si aggiunge
elixir acido di Haller e solfato di chinino
a gram. Due e mezzo.
una cucchiainata ogni due ore al malato
fino interrotta da una compressa di
chinino / solfato e cloridato /
se la febbre si continua la cura con
la decozione due compresse di chinino,
pillole di protoioduro di ferro prima e
dopo si passa al liquore arsenicale,
più semplice, alle pillole di arsenichinino

VII bicloruro di chinino gram. dieci
citrate di ferro emmaniacale verde gram. tre
arsenite di soda centigr. quattro
solfato di strichina centigr. due
acqua distillata gram. cinquanta
dieci gocce prima di pasti

VIII nella cachexia malarica
della ampiezza di lipoidi del sangue
e per insiezioni ipodermiche una al giorno

SCIROPPO PAGLIARI

1.0 g. re Comodo
Efficace - Sicuro

19 Venerdi s. GIULIANA GIUGNO MAD. CONSOLATA Sabato 20

IX. foglie di matricaria gr. dieci
ergofina gr. tre, estratto fluido di yponocy gomme quassia, utrop di Matricaria gr. tre
una cucchiai ogni due ore fino all'effetto
X. Metronadina a gomme - Venerdi 5 ore fino a tre, sabato al giorno - fiale per intere
zioni 10 gocce a g. tre, estratto fluido di yponocy gomme quassia e Ergofina 4 o tre si proba
vedere una seconda iniezione, non più di due volte al giorno -

- I Metronadina
Estratto fluido di viburnum prunifolium e di hydrastis canadensis in gran dose
1. venti gomme ogni 4 ore fino all'effetto
- II acido gallico gram. tre
m. con ergofina g. b. e f. pillole n. 6
1. una ogni due ore
- III stipticina centigr. dieci
f. c. f. 5
1. una ogni quattro ore
- IV (a) fiale d'ergofina n. 2
b. fiale di stipticina n. 2
d. iniezione una alla volta ogni 4 ore
- V acido gallico gram. cinque
adrenalina soluzione al 1% gomme trenta
acqua distillata gram. centoventi
1. un cucchiaino ogni due ore
- VI fiale di gelatina emostatica: miridina
Metronadina serone. plus
- VII fiale di hydrastinina
- VIII succo di china 5% gr. centoventi
lorum di calice gr. due
estratto di hydrastis canadensis gomme quaranta
ergofina gr. mezzo
aq. distillata gr. cinquanta - sciroppo della 5 radici gr. trenta

X glandola piannmaria fusio nande s tre parbyti al giorno ner'ora
prima dei parti

21 Domenica s. E2 e quelli d... ANNO V. Lunedì 22

Neprideⁱⁿ *Asca dei gottosi e*
degli scrofolosi con edema, trasuda
di notte, cavità sierose, o e. udoli pleuratici
sp. del latte di stromzia gram. 2000
f. castoreo 4° 2000
1 Due a quattro al giorno in acqua

II *nepride acuta e cronica*
sp. della soluzione di adrenalina 1/2 per die
1. da 3 a 5 goccie ogni tre ore consumando
da non più di 50 goccie al giorno
U.C. diete latte, verdure, carne bianca,
pesce bollito. per i bambini 3 a 5 goc-
cie di soluzione di adrenalina ogni cinque ore
consumando 15 a 25 goccie nelle 24 ore
ed ogni 2 ore una cucchiainata di caffè
di infuso di radice versatilis 2% gram centomila
bicarbonato di soda gram. uno mezzo
liquore amaro di ammonio gram. due
oss. acide scillitico gram. 1/2

III *per fare scomparire gli stanni, cura di*
denti da crisi epatica, id. ep. epite
ex. epia 20 ancheletti nei cucchiaini la
caffè al giorno / l' ex. epia è un potente
e sicuro diuretico

Dopo i pasti
DUE o TRE

PASTIGLIE VICHY-ÉTAT

facilitano
la digestione

25 Giovedì s. MASSIMO GIUGNO v. RODOLFO Venerdì 26

Neuralgia

I

fenacetina e aspirina gram due
piramidone gram uno e mezzo
caffèina gram uno
magnesia usta gram mezzo
m. fa cachets N° dieci

Da uno a tre ogni ora fino alla calma
N.B. nei soggetti malarici si aggiunge
cloridrato di chinina gram uno e mezzo

*Il bromidato di
sodio cont. 15
fenacetina cont. 30
caffèina cont. 15
piramidone cont. 15
m. fa un.*

Le zone dolori articolari
dell'acido salicilico lanolina ed essenza
di trementina ca gram dieci
sugra di mirale gram ottanta
atropina per dieci micubi la part.
dolente e ricopra con panco di lana cald.

II

dell'algia gram due
fenacetina gram uno
m. fa cachets di nove

due al giorno fino alla calma
Per atropinazione sulla regione dolente si usa pure

(a) unguento di belladonna gram venti
acido salicilico gram due
cloridrato di morfina gram uno

(b)

soler alcool clorofornio ed olio
di ricini ca gram dieci

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ANTICOL”

27 Sabato S. MAGGIORINO GIUGNO S. ATTILIO Domenica 28

- III. nella nevralgia lombare
bell'acido salicilico, essenza di tre-
mentina, lanolina e vasellina
aa grammi dieci
per frizioni leggere
- IV. valerianato di chinino gram. uno
bromuro d'ammonio gram. due
oppio centes. quindici
m. et c. d. 8
per una ogni due ore fino alla calma.
- V. acqua di lauroceraso, tintura di valeriana e tintura di castoreo aa gram. cinque
laudano gram. uno
l. 15 a 20 goccie all'ora in acqua
- VI. olio di belladonna e di giusquiamo e cloro-
formio aa gram. cinque
tintura di iudata e di acanito aa gram. quattro
m. frizionare la parte dolente
- VII. olio di giusquiamo, balsamo tran-
quillo, laudano aa gram. dieci
cloroformio gram. otto
per frizionare la parte dolente.
- VIII. massaggio vibratorio con il "veedeo"
per 5 minuti nella regione dolente

Non dimenticare
di indicare chiaramente

VICHY-ÉTAT

nel prescrivere le Acque
ed i Prodotti di Vichy

29 Lunedì SS. PIETRO E P. GIUGNO COMM. S. PAOLO Martedì 30

	Nervastenia			
I	Glicerofosfato di calcio granulare, o compresse o nucleobol Rubin			
II	Proton Plus sei			
III	Dichiosano Baktilla			
IV	Diarsen Valero-fosfor Wassermann			
V	1. Due cucchiaini al giorno 1/4 d'ora prima dei pasti se si manifestano convulsioni Boue valerianica thimo-menthol 1 a 5 o 15 goccie al giorno			
VI	se vi ess'esse rasiarità venosa o elixir de virginie Nydahl			
Bokanol				
1. tre a quattro serie di assie zioni di dieci giorni l'una con 7 giorni d'intervallo tra l'una e l'altra	1. un cucchiaino principali parti	due volte al giorno prima dei partii		
	ossaluria fosfato di sodio citrate di sodio solfato di magnesio acqua distillata gr. centocinquanta		ca gr. cinque	
	di un cucchiaino da caffè per dieci giorni e sospenderlo per altri dieci giorni e poi riprendere			

Riassunto di GIUGNO

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1				
2		Ossinuriasi		
3				
4	I	del butolan	gr. Dieci	
5	piccolitili	tre volte al giorno	e per otto giorni si dia	
6	sterilizzati	una cartina in acqua	di butolan gr mezzo	
7	ed essere	per i ragazzi sopra i 12 anni	e per gli adulti	
8	oppure	per i bambini dai 4 ai 12 anni	di cartine	
9	con gr. venti	Dovranno essere	di centig. venticinque l'una	
10	di sale	per i prossimi tre giorni	si farà fare un piccolo	
11	in meno di	clistere, e si cambierà	la biancheria da letto	
12	tre di acqua	la mattina del nono giorno	si darà un purgan-	
13	te di olio di ricini			
14	o supposti con tutto di cui con 20 cent. 50 gr. o con 5 centig. unguento			
15	II	I delle compresse	di butolan Bayer	
16	nelle bambine		un tubo di n. 20	
17	quando sono in fase le vie genitali	una compressa al mattino	una a mezzogiorno	
18	bagni generali	ed una la sera per tre giorni	negli adulti si	
19	supposti	al 4.º giorno un purgante	di calomelano	
20	e tre volte la settimana	di ricino per altri tre giorni	le compresse	
21	cazioni vaginali con soluzione di permanganato	Dall'ottavo giorno in poi	risisteri una acqua saponeata	
22	la papaverina	Massima pulizia specie	della regione anale	
23	per conciliare il sonno	ogni sera un clistere	con acqua di calce gr. 50	
24	ipalmiti per 5 o 6 giorni	orticaria		
25	la regione dell'ano e del perineo	mentolo gr. Dieci		
26	con unguenti mercuriali	clorofornio, edese ed alcool	una gr. brenta	
27	e Vaseline	per lozioni e polverizzazioni		
28	a parti uguali	cosparzendo poi le parti	con polvere di ossido	
29		e ossido di zinco		
30				
Totale			TOTALE	

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

1° Mercoledì S. TEOBALDO LUGLIO VIS. DI M. V. Giovedì 2

Odontalgia

Nella carie Pulizia e cura della bocca.
Clorofornio creosoto e tannino dieci gocce di tintura di iodo in mezzo bicchiere di acqua per sciacquare la bocca la sera nell'andare a letto.
ii. g. Jue benzoino
ii. g. Jue
con cotone Se vi è dolore o acuenno di pericabite alveolare, allora per tre o quattro volte al giorno si frizioni la parte dolente minacciata di flussione, avendo cura di spubare l'eccesso di saliva, col dito umido e spalmato con storovina centigram. venticinque.
mentolo zucchero e bitume polverati gram. mezzo.
clorofornio e mentolo Stovaina centigram. venticinque.
lanza a guaiacuo occludere la parte cariatata del dente.
di un batuffoletto
di cotone imbevuto
nella soluzione di
occludere la parte
cariatata del dente
777 oppium Nel salolo gram. tre
acido fenico g. due
essenza di menta gram. uno
canfora, alcool g. di garofani, di cannella e di anice di gram. mezzo
clorofornio g. due
alcool gram. centonovanta
ii. g. quattro in un uccidi di the in un litro di acqua
si come sopra per sciacquare la bocca per pulizia.

1.12 (a) Per calmare i dolori da carie di denti
 laudano goccie 15 si svuota la cavità cariatata, e si applica un
 fenolo goccia 8 batuffoletto di cotone imbevuto di
 mentolo centg. 10 acido fenico cristall. gram. dieci
 creosoto gocce 5 morfina gram. uno
 alcool g. 15 essenza di bergamotto gram. due
 con un batuffolo di glicerina gram. tre
 cotone, sovrapposto di si badi di non fare toccare il liquido con le parti
 cariate.

Ogni Medico ha quotidianamente l'occasione di prescrivere i GRAINS DE VALS

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Servono a prepararsi da
sè l'acqua alcalina ga-
sosa.

Molto economici.

3 Venerdì

s. ELIODORO

LUGLIO

s. ULRICO

Sabato 4

1° (b)

oppure
si svuota la cavità cariale, si lava
con acqua tiepida con uno schizzo
lo, si asciuga e poi si mette un batuffolo
di cotone imbevuto in
clorale idrato e canfora à gram. quattro
morfinia centigr. venti
acqua di lauroceraso gram. dieci

(c)

oppure
svuotare, lavare la cavità del den-
te guasto, applicare evitando di com-
primere tamponcini di cotone im-
bevuti di una delle seguenti miscele
1° clorofornie e creosoto à gram. cinque
laudano e tintura di benzoino à gram. quindici

2° clorale e canfora polv. à gram. cinque
cloridrato di cocaina gram. uno
alcool gomme venti

3° si bagna un batuffolo di cotone e si applica
sul dente dolente.

V

Per calmare i dolori indipendenti da carie
dell'acqua calda di lauroceraso gram. dieci
cloridrato di morfinia ^{centigr.} à gram. dieci
cloridrato di cocaina centigr. venti

1. ventiquattro in una tazza da caffè
di acqua tiepida zuccherata per
sciogliere ripetutamente la bocca.

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

"ANTICOL"

5 Domenica S. FILOMENA LUGLIO S. DOMENICA Lunedì 6

VI
 VI
 Dai dolori dei reni e dell'orecchia
 chiari bene gli occhi, la bocca, ed
 una narice si fa inspirare con
 la eraria libera un po'
 di olio di, enape ed etere a gran. impa

Denti macchiati nella cura di ferro.
 dell'acido cloridrico ed acqua di Sill. a gram. Dieci
 con un tamponcino di ovatta attorcigliato attorno ad uno stecco di stoffa
 non. i reni per una sola volta,
 in seguito e per quindi'ci giorni si
 strofinano con
 clorato potassico solo gram. cinque
 creta lavata gram. Dieci
 polvere d'iris versicolor gram. venti
 essenza di menta goccie cinque

VII
 mentolo ed idrato di clorato a gram. uno
 glicerina gram. cinque
 con un tamponcino imbevuto per applicazioni locali

VIII
 idrato di clorato, canfora, acido fenico a gr. cinque
 come la precedente

IX
 acqua di stauroceraso gr. Dieci
 ca ottimi effetti stovaina goccie quattro
 acido fenico goccie tre
 cloridrato di cocaina centigr. venti
 essenza di jatrofona goccie due
 laudano goccie venti

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT NEUROSINE PRUNIER

con un beccafilo di abete macerato
si dicono il dato in 16 minuti. e si sissano

VICHY-CÉLESTINS

GOTTA
DIABETE
RENELLA

7 Martedì

S. SAVINO

LUGLIO

S. ELISABETTA

Mercoledì 8

X

Per calmare i dolori.

Se i dolori sono poco intensi, bastano una compressa di aspirina da centig. cinquantatre volte al giorno.

XI

nei casi di dolori neuralgici violenti o persistenti, dà buoni risultati il trattamento di chinina con oppio e belladonna

XII

coltuttori con un forte infuso origano e di madrigari camomilla
(estr. di valeriana e di chinina centig. quarantacinque estr. di oppio e di belladonna a centig. sei) una pillola la mattina e una la sera una o due ore prima del pasto

Orchite

Dell'unguento di belladonna gram. venti
idriolo gram. tre
d. uso est. r.

orticaria cronica

I. peptone e creta preparata in gr. quindici m. e fa c. H.° trenta d. una un'ora prima del pasto.

II

iposolfato di soda da 3 a 5 gram. al giorno in porzione

III.

ogni mattina a digiuno una cucchiaino di g. affetto di soda. N.B. non caffè, non vino, non cavoli, non tarbuzi, non fragole, non gelati, non bevande gassate

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO
INALTERABILE

9 Giovedì

S. LETIZIA

LUGLIO

S. SECONDINA

Venerdì 10

otite acuta

I

acido picrico gram. uno

acqua distillata gram. venticinque

II

oppure: acqua di Alibour gram. cinque

acqua distillata gram. dieci

I. Si riempie il condotto uditivo per due o tre volte di seguito e per due minuti alla volta, con acqua ossigenata a 12 volumi e dopo asciugato bene l'orecchio s'istillano alcuni gocce nell'orecchio mattina e sera.

Delle su scritte soluzioni:

10. per la composizione dell'acqua di Alibour vedi a pagina 115.

III

Nella forma cronica

(a)

perbargolo gram. uno

acqua distillata gram. cinquanta

di un'ora oscura

si praticano lavaggi con acqua bollita tiepida e poi s'istillano nel condotto uditivo due o tre gocce, una volta al giorno la mattina e la sera.

(b)

ossido di zinco gram. uno

vasellina gram. dieci

si prende un pezzo di garza spalmata di questo unguento e s'introduce nel condotto uditivo.

11 Sabato

S. PIO PAPA

LUGLIO

S. NABORRE

Domenica 12

Nella suppurazione ostinata instillare
ogni giorno od ogni due giorni nell'orec-
chio 6-8 gocce di

IV

solfato di zinco centigr. dieci
acqua distillata gram. venti
oppure

V

solfato di rame centigr. cinque
acqua distillata gram. quindici.
Se vi è dolore

VI. (a)

acido borico gram. uno
alcol assoluto gram. venti
di bagni uno spunto di garza e
s'introduca nel condotto uditivo al-
ternativamente con

(b)

resorcina gram. uno
acqua distillata gram. venticinque

VII

acido fenico cristall. centigr. trenta
cloridrato di cocaina centigr. quaranta
" " di morfina centigr. cinque
glicerina neutra gram. quindici

di instillare due o tre gocce nel condotto uditivo
mattina e sera previa ripulimento a bagno-mari

OZENA

polverizzazioni giornaliere o a giorni alterni
con una pera di gomma munita di una cannula
di calibro sufficiente largo - e con polvere
a base di nido di sangue se ne preparata
dall'Istituto Sieroterapico Milanese

SCIROPPO PAGLIARI

Purgante Comodo
Efficace - Sicuro

13 Lunedì S. ANACLETO LUGLIO S. BONAVENTURA Martedì 14

I	Pielide farina torbida, con gran copia di albumina e di pur. e di reazione alcalina e detriti di granuli adiposi dell' amido centigr. Dieci f. e. n° venti quattro al giorno una ogni tre ore
II	oppure Pagine 14 3 a 10 capsule al giorno nell' intervallo di pasti
per riassorbire i residui nell' intestino e lo stesso base di un dr. di iodio esparina Kozak aumento di peso nella pleurite nella peritonite cloruro di calcio gr. cinque aq. distillata gr. cento sciroppo gr. cinquante di due cucchiai al giorno si aumenti ogni giorno di cloruro di una gomma fino a gr. quindici a venti di perrellazioni	per i paraffini della pleurite per di iodio esparina Kozak scap. 4 iniezioni nella regione pleurica e mattina e sera con polvere di terpina e benzoino scap. ai giorni gr. dieci 60 PATERICCIO canfora gram. cinque mentolo gram. due e mezzo tintura di iodo gram. dieci alcool a 90° gram. cento

Per impedire le FRODI e le sostituzioni bisogna aggiungere sulle ricette alla parola VICHY il nome della Sorgente.

15 Mercoledì S. CAMILLO LUGLIO M. DEL CARMINE Giovedì 16

I. *Pirosi gastrica / bruciore di stomaco /*
 della magnesia usta, bicarbonato di sodio
 e carbone di raffinato di granodio in gran. cinque
 f. e. n.° venti
 1. tra al giorno un' ora prima dei pasti

II del salicilato di bismuto, magnesia inglese
 e bicarbonato di sodio in gran. dieci
 salolo gram. quindici
 m. e. f. n.° di trenta
 1. tra al giorno una ora prima dei pasti
 Nota: proibiti i salati, le fritture l'aceto

se vi è dolore
 III magnesia usta gram. dieci
 sottocitrato di bismuto gram. due e mezzo
 carbone di Bellor gram. tre
 oppio centig. venti
 m. e. f. n.° 10
 1. una prima del pasto evitando gli
 acidi

IV
 (IV bis)
 fosfato di calce gr. cento
 magnesia usta gr. 40
 bicarbonato sodico gr. venti
 1. un macchinario in op
 prima di somministrare
 minuti dopo il pasto
 Lattorio e magnesia usta in gram sette e mezzo
 sottocitrato di bismuto gram. due e mezzo
 creta preparata gram. tre
 codeina centigram. dieci
 bicarbonato di sodio gram. sei
 m. e. f. polveri n.° dieci
 1. una al momento del pasto

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ ANTICOL ”

17 Venerdì

S. ALESSIO

LUGLIO

S. FEDERICO

Sabato 18

Poliadenite

I'

del iodo gram. due
guaiacolo gram. sei
ioduro sodico gram. otto
acqua distillata gram. cinquanta
in uso ipodermico

II

Sette fiale di soluzione durante F. 48
In uso ipodermico
aria e bagni marini.

Psoriasi

I

del sapone antisporico con solfo ed
talco del dott. Cassia di Milano

II

Sp. solfo precipitato gram. uno
guaiacolo gram. cinque
canfora gram. dieci
eucaliptato gram. venti
olio di sesamo qb. per fare cento e³
d'iniettare con ecc. al giorno

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

19 Domenica s. VINCENZO P. LUGLIO S. MARGHERITA Lunedì 20

Diaghe sorpide

I (a)

Sennarolo gr. cinque
 f. polverizzazione sulla piaga e subito liscata
 (b) cloruro di zinco gram. mezzo
 acqua distillata gram. cinque
 A si piegherà la piaga e si copre con cotone idrofilo

II

aceto spirina gram. cinque
 acido borico e satolo an gram. tre
 iodolo ed acido fenico an gram. uno
 sublimato corrosivo centigr. dieci
 vasellina gram. cinque a dieci

si immerga la parte piagata per pochi
 minuti in acqua a 50° e poscia si gal-
 mi il medicamento e si ricopre con garza cotone

III

Iodio gram. uno
 ossido di zinco e carbonato di bismuto a q. s. sei
 vasellina gr. cinquanta

Finis est

Berniciosa malarica

iniezione di cloridrato di chinina e carboni
 poraceamente iniezione di un c.c. di soluzione
 di atropina al millesimo

GOCCE JODO-FERROSE PAGLIARI

Soluzione titolata inalterabile

21 Martedì S. PRASSEDE LUGLIO S. MARIA MADD. Mercoledì 22

Bolmanite

I Soluzione di digitalina Nativell. goccie cinquante
 acqua di melissa sciroppo di gomme arabi-
 ca e di sciroppo di arancio amaro in quant. fronda
 Due cucchiaini all'ora fino a che il
 polso scende al normale

II Nelle foglie di digitale gram. quattro
 nel bambini poligola senega gram. otto
 dai 5 a 10 anni me. ef. infuso e colatura di gram. Duecento
 caffeina cent. 25 sciroppo di alchermes e di melissa in quant. vend.
 benzoato. gr. 1-2
 Tetrigit di digitale m.
 di chinina gr. 2
 anz. fiori Tarantolo gr. 40
 di un cucchiaino
 due di all'ora

Due cucchiaini all'ora, ogni 4 ore
 si sospende e si dà una tazza di
 latte o brodo con un cucchiaio di cognac

III iniezioni di electraryola

IV (a) Tintura di oppio e di belladonna in goccie fresche in quan-
 sp. cloridrata di ammoniaca gram. quattro
 fiale di 5 cm³ sciroppo di fiori di arancio gram. venticinque
 di difenilformica + semplice gram. settantacinque
 2 cm³ secondo acqua distillata gram. cento cinquanta
 di un cucchiaino a minestra giorno e notte ogni ora
 (clor. comp. b.) applicazioni calde sul lato ammalato per
 • due al giorno 24 a 48 ore e se occorre per 72 ore
 per inferiera mila
 r. glister N. B.
 Se dopo la caduta della temperatu-
 ra si aumenta l'intervallo fra le dosi por-
 tandolo a quattro ore, ma sempre giorno e notte.

10 Centesimi il pacco per un litro d'acqua

SALE VICHY-ÉTAT

23 Giovedì S. APOLLINARE LUGLIO S. CRISTINA Venerdì 24

V

emulsione di gomma arabica gram. duecento
solfato di magnesia gram. dodici
bicarbonato di soda gram. quattro
estratto di aconito centigr. cinque
sciroppo di alchermes gram. quaranta
m.

Due cucchiaini la mattina all'ora

VI

nei bambini da 4 a 10 anni

cura abortiva sp. benzoato sodico gram. uno e mezzo
della polmonite(?) caffeina centigr. venti
cataplasmi cal. sciroppo di digitale gram. cinque
diversi di linse " " di china gram. venti

me per un'ora acqua di fiori di arancio gram. quaranta
cadi cospette sec. d'un cucchiaino la caffè all'ora

che mantenute
a lungo in situ, la
non lasciare un
centimetro di pelle
non trattata nella
ematorace affetto,
infine in corrispon-
denza della cosce
stiane polmonare
cospette a sangue
da cavare almeno
ogni 250 di sangue
in persone robuste.
e ciò nel primissimo
tempo d'invasione

Per fare abortire la polmonite, e quindi
nel primissimo periodo

salicilato sodico centij. quaranta
piramidone centij. trenta
fenacetina centij. quindici
caffeina centij. dieci
se:

se con questa cartina non si otterrà una
sufficiente sudorazione alla dose
di cavare almeno gli organi, si darà una
dose di sangue e casi ogni 4 o 5 ore

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

25 Sabato

S. GIACOMO

LUGLIO

S. ANNA

Domenica 26

		Prurito essenziale		
1	(a)	cloralio idrato gram. due		
		acqua distillata gram. cento		
		liquore di Van Swieten gram. ottanta		
		per lozione sulle parti pruriginose		
		oppure		
	(b)	acido fenico gram. uno		
		glicerina gram. venticinque		
		acqua distillata gram. settanta cinque		
		oppure polverizzazioni fredde con:		
	(c)	mentolo ed alcanol canforato an gram. dieci		
		clorofornio ed etere solforico an gram. trenta		
		e dopo le lozioni spolverare con:		
		canfora polverata gram. uno		
		acido borico polverato gram. cento		
		oppure spolverare con:		
	(d)	mentolo gram. uno		
		vasellina borica gram. cento		
		oppure con:		
	(e)	guaiacolo gram. uno		
		vasellina borica gram. cento		
		Esternamente		
	(f)	estratto di valeriana e di yucca in gram. uno		
		cloralio gram. uno estratto di belladonna centesimi. venti		
		olio canforato g. Fer con estratto di graniglia e fa pillole con		
		lanolina e vasellina		
		an gr. 25		
		Due o tre al giorno		
	(g)	idroterapia		
21		lamianian. vedi a pag. 178		

Durante i pasti
bisogna bere la

ARSAMINOL
Pentavalente Sol. concentrato
minimo 4 ossifenilarsiti to di die

ELESTINS

27 Lunedì S. NATALIA LUGLIO S. INNOCENZO Martedì 28

I contro il prurito della vulva o dell'ano
 cloridrato di cocaina gram. uno
 catu-cream fresco senza odore gram. cent. 100
 — uso esterno

I prurito della scrota e perineo con framb.
 mento rianarsi

I prurito vulvare
 acido salicilico e borace an. gram. tre
 acido borico gram. due
 insulina glicerina ed alcool an. gram. 20 dieci
 fino a 200 unità

frizioni mattina e sera
 prurito da anafilassi alimentare
 cloruro di calcio gram. dodici
 tint. di cancrio d'arancio amaro e acqua cloriformica an. gram. tre
 acqua distillata gram. novanta
 3 tre cucchiaini da minestra al giorno

Pustola maligna

I olio ess. di trementina gram. dodici
 con solf. di chinino 7 bast. prof. pasta
 si applichi sulla pustola

causticazione: iniezioni ipodermiche di acido fenico 1%
 sulla parte da necrosarsi impasti di sublimato
 residuo 1 a cinque mila sequiti d'applicazione ipodermica
 all'istolo 3-0% = iniezioni d'acido con
 e di zinnargolo

la rinvigorisci
 24 ore la notte con dimissioni se si continua solo la notte con

VICHY-HOPITAL

AFFEZIONI DELLE
VIE DIGESTIVE

31 Venerdi

S. IGNAZIO

LUGLIO

Memorandum

di leggero massaggio. Utilissimi nell'estate i bagni di sabbia calda per quindici minuti. Quando le condizioni intestinali sono ritornate buone s'inizierà la cura medicamentosa.

(a)

Nei primi quindici giorni si darà un cucchiaino di caffè di lattoparsato di calce mattina e sera, e dopo i quindici giorni una delle seguenti polveri sciolta nel latte due volte al giorno e nell'estate

(b)

del gliceroparsato di calce centigr. quindici
protossalato di ferro centigr. cinque
magnesia usta centigr. quindici
zucchero polverato centigr. trenta
Nell'inverno si darà due volte al giorno una cucchiainata di

(c)

olio di fegato di merluzzo gram. cinquecento
soluzione di lattoparsato di calce gram. centocinquanta
gomma arabica gram. cinque
alcolatura di corteccia di limone gram. venti
sciroppo semplice gram. trecentocinquanta
oppure

(d)

olio di fegato di merluzzo gram. centocinquanta
sciroppo iodo-tannico gram. cinquanta
o semplicemente due volte al giorno un cucchiaino
di sciroppo iodo-tannico

(e)

nel rachitismo grave con rapide deformazioni condurre dare una o due cucchiainate al giorno di olio di fegato di merluzzo o di mandorle dolci gram. centocinquanta

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

ANTICOL,,

29 Mercoledì

S. MARTA

LUGLIO

S. GIUSTA

Giovedì 30

Rachitismo

Si distinguono due specie di rachitismo.
Il piccolo rachitismo che comincia nei bambini a otto mesi e scampa a 3 anni.
Caratteri: prominente torze frontali e parietali, persistenza della grande fontanella, torace costale, incurvamento della tibia. Tali deformazioni si attenuano rapidamente per sempre con la crescita.

Il grande rachitismo può essere congenito e le sue deformazioni sono precoci e persistenti: la ossa fortemente incurvate e si ha cifosi torace di polso, cranio tace, Debilità congenita, atropia sifilitica, tubercolosi.

Il piccolo rachitismo ha quasi sempre origine da tossi-infezione intestinale. Bisogna quindi per primo disinfettare l'intestino con dieta idrica, o acqua da 12 a 20 ore, tutti i giorni praticare una o due lavande intestinali con grammi 500 di acqua bollida e due cucchiai di acqua ossigenata. In caso di costipazione un cucchiaio no. 10 caffè di olio di ricini e di mandorle a parti uguali: aria libera o sul mare. Ogni mattina frizioni a reumatismi e sugli arti deformati e quin...

Riassunto di LUGLIO

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1				
2	(f)		olio fosforato al millesimo gram. due e mezzo	
3			nei bambini, sereni bagni caldi a 36° per	
4			dieci minuti ed eventualmente anche	
5	(g)		il bromuro.	
6			nel rachitismo da sifilite congenita frizioni	
7			con unguento napoletano, o	
8	(h)		oppure col	
9			liquore di Van Swieten gram. trenta	
10			da dieci a venti goccie nel latte da consumi-	
11			si durante tutta la giornata.	
12	(i)		nel rachitismo subscolare, aria-cure marine	
13			o un cucchiaino di ogni due volte al giorno	
14			di sciroppo iodotannico gram. duecento	
15			sciroppo di china gram. cento	
16			arseniale di soda centigr. tre	
17	IT		eutonina	
18			cura secondo istruzioni a stampa	
19				
20				
21			Proserina - vitonina O.	
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
Totale				TOTALE

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ANTICOL”

1° Sabato

S. EUSEBIO

AGOSTO

MAD. D. ANG.

Domenica 2

Tragadi del seno

1

*Si lavi il capezzolo dopo ogni poppata
con: alcool a 90° gram. cento*

(a)

*acqua sterile gram. cinquecento
indi si applichi con tampone*

*balsamo del Perù e tintura d'arnica aa gram. duecento
acqua di calce gram. quindici*

*olio di mandorle sterilizzato gram. trenta
oppure*

(b)

*tintura di benzoino e di balsamo del Tolu aa gram. quindici
oppure*

(c)

*glicerina e liquore di Van Swieten aa gram. dieci
oppure*

(d)

*lannido ed ossido di zinco aa gram. tre
estratto di oppio centigr. venti*

glicerolato di amido gram. trenta

Prima di porgere il seno si lavi con acqua bollita

PASTIGLIE VICHY-ÉTAT

Preparate coi
Sali Naturali

3 Lunedì

S. LIDIA M.

AGOSTO

S. DOMENICO

Martedì 4

			Aspreddone		
I	Pizzanidone	gram. cinque			
	sauroscia	gram. uno			
	cloridrato di cocaina	centigr. 2			
	essenza di rose	q. b. per profumare			
	si per fondere in a quattro volte il giorno				
II	ricostituente del sangue di nervi				
	neurophile Courtois	a grasse			
	Courtois				
	via Accademia Albertina	5			
		2			
III	parayouglina Nassalle				
III	Stenos-gene	migliaccio			

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

5 Mercoledì MAD. D. NEVE AGOSTO S. SISTO P. Giovedì 6

Raucedine nei bambini

bell'antipirina gram. mezzo
 bromuro di potassio gram. uno
 sciroppo di codeina gram. dieci
 " Del Polio gram. venti
 " Di fiori di arancio gram. trenta
 acqua distillata gram. sessanta
 1 un cucchiaino da caffè all'ora

Rinite

I
 mentolo gram. uno
 olio di mentolo gram. dieci
 1. instillare nel naso 2 o 3 volte al giorno

II
 boraceo di soda gram. cento
 mentolo gram. mezzo

1. un cucchiaino da caffè 3 o 4 volte al giorno
 d'acqua tiepida per gargarismi

III

Protargolo gram. due
 acqua distillata gram. venti

1. nel primissimo tempo per fare obliterare
 la rinofaringite abbondanti per notte
 ture sulla mucosa nasale più volte al
 giorno, reclinando il capo all'indietro
 affinché la soluzione possa arrivare
 nel faringe

RENI
VESCICA

VICHY-CÉLESTINS

7 Venerdì

S. GAETANO

AGOSTO

S. CIRIACO

Sabato 8

Rheumatismo = per uso interno: Thyoidina (1)

I (a) Antogra Bistresi (p) idro-iodo Brestle (c) Utra
Donat S. L. Chatelain secondo istruzioni stampate
per uso esterno

(a) clorofornio gram. quindici
salicilato di mesite gram. venticinque
olio camforato gram. trenta
balsamo tranquillo gram. settanta

(b) oppure
acido salicilico, lanolina, ed essenza
di trementina aa gram. dieci
sugna lavata gram. ottanta

(c) oppure
mesotano ed olio di olive aa gram. quindici
salicilato di mesite gram. uno
1 pannello usi tre o quattro volte al giorno

(d) oppure
unguento di belladonna gram. venti
acido salicilico gram. due
cloridrato di morfina gram. uno

(e) oppure
tintura di succino o di arnica gram. cinquanta
camfora gram. cinque
ammoniaca liquida gram. quattro
laudano gram. cinque
claroso di solio (sale da cucina) gram. sei
acqua distillata gram. cinquecento.

1 si riprendono bande di lino in questa miscela
e si avvolge la parte dolente.

(1) la Thyoidina trovasi nell'Istituto Neuropatico Italiano a Bologna

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ANTICOL”

9 Domenica

S. GIUSTO

AGOSTO

S. LORENZO

Lunedì 10

II Nel reumatismo articolare acuto e cronico
in cambio dell'usuale cura salicilica
cloroformio si praticano a giorni alterni iniezioni
olio di uliva in endovenose di un centimetro cubo
e alcool camphorato (una ordinaria siringa Pravaz piena) della
seguente soluzione
Iodo iodato sublimato corrosivo centigr. cinque
cloruro sodico centigr. venticinque
acqua distillata e sterilizzata gram. cinquanta

III Sul sofferto di magnesio gram. dieci
acqua distillata e sterilizzata gram. quaranta
olio di ginseng
cloroformio si iniettano quattro centim. cubi al giorno
e salicilato di in unica volta nella regione glutea as-
sorbendo la cura di salicilato di soda
dopo quattro iniezioni il dolore, la dis-
appetenza e la febbre cessano.
IV massaggio vibratoria con il "vee dee" per
5 a 10 minuti

V Kélon (floruro di edite) in forma automatica
di polverizzare la regione dolente.

VI Urastenite "Sanit" granulare effervescente
fa base di piperazina, eliminato di litio su.
per artrosi, reumatismo, gotta, idios. biliose m.
Farmacia "Società la Sanitaria" Via Museo 68 Napoli

Dopo i pasti
DUE o TRE

PASTIGLIE VICHY-ETAT

facilitano
la digestione

11 Martedì S. TIBURZIO AGOSTO S. CHIARA Mercoledì 12

VII

salicilato di soda gram. sedici
bicarbonato di soda gram. otto
acqua distillata gram. trecento
J. un cucchiaino ogni due ore in un bicchierino di acqua di fonte fino a dieci cucchiaini nelle 24 ore incominciando a mezzogiorno per finire alle 8 del mattino, e da questa ora fino alle 12 non si prenda salicilato di soda.

VIII

soluzione di adrenalina al 1% gr. dieci
per iniezioni $\frac{1}{2}$ cc. una al giorno di 1 cm³

IX

cloroformio, olio di ginseng e salicilato di amile
ca gr. dieci
J. uso esterno

X

ung. di belladonna gram. venti
salicilato di metile gram. uno
uso esterno

XI

dequidano cronico
carbonato di litina gr. due e mezzo
benzoato di sodio gr. uno
leobromina gr. cinque
J. J. corline n. dieci
J. da una a due al giorno

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO
INALTERABILE

13 Giovedì S. IPPOLITO AGOSTO S. ALFREDO Venerdì 14

Ritenzione di urina

contro la ritenzione di urina e come purgante
Solfato di magnesio gram. quattro
acqua distillata e sterilizzata gram. dieci
~ iniettare una siringa in un cubito cubo

Minite.

Ammonio, camphora eucalyptalis
50 cent. Dieci
olio di vasellina
gr. Dieci

Si iniettare due a due goccie nella narice

Stimolante nella convalescenza

Si scodo metallica gr. uno
ioduro potassico gr. tre
liquore del Gassler gr. venti
acqua distillata gr. cinquanta

Si quadrare goccie la mattina nel latte

Non dimenticare
di indicare chiaramente

VICHY-ÉTAT

nel prescrivere le Acque
ed i Prodotti di Vichy

15 Sabato ASS. DI M. V. AGOSTO S. ROCCO Domenica 16

Scabbia

I
 I^{II} 2
 Mitigal 1/2
 Solfato di sodio gram. Duecento
 acqua bollita gram. ottocento

B
 Mitigal
 acqua bollita gr. Duecento
 acido cloridrico gr. Dieci

Diagnosi Clinica
 iradamentosa = Alla sera, prima di coricarsi, presso bagno
 strofinarsi col mitigal di pulizia, e semplice sapone senza strofi-
 nare le tutte il maschio, si percellano le parti affette con
 corpo massimamente la soluzione B.
 punti di predilezione il mattino successivo percellarsi con la
 della malattia per soluzione B. E così di seguito per due o tre
 tre giorni, e dopo 20 giorni, e a volte con un giorno d'intervallo.
 alla 3^a strofinazione cura capita

III
 o meglio
 Saponi antiscabiosi del dott. A. Cassin di Milano
 si lavano le regioni affette con acqua tiepida
 si faranno la sera e sulla pelle, e si inumidita si fanno con
 ogni 1/4 di ora 2 ore frizioni col sapone antiscabioso bagno
 per tre volte con acqua ben calda si lavano le parti con
 mattina seguente frizionale e si coprono con un batuffolo
 un bagno di pulizia di essere con polvere di fiori di zolfo etereo
 sia. Bastano queste a parti equali parte fornita dalle acque di Vichy
 le sole strofinazioni

IV
 Pomata di Helmerich-fiori di zolfo gr. 4
 sottercarbonato di potassa gr. Due (sugna
 lavata o stovellina gr. sedici)

alcali a 20° gr. cento: naffolo B. gr. sette a Dieci
 (due lozioni una dopo l'altra per tre a quattro giorni)

Sciatrica

I Sp. antipirina gram. dieci
cloridrato di cocaina centigr. quindici
acqua distillata e sterilizzata gram. dieci
iniezioni profonde nella regione dolente
una al giorno.

II bulbi di ranuncolo perlati ed applicati sotto il calcagno della gamba dolente.

III Solfuro di magnesio puro gram. venti
acqua distillata e sterilizzata gram. ottanta
iniezioni nei glutei quattro centimetri cubi al giorno in unica volla fino alla scomparsa del dolore.

finale d'iniezioni
ne antisciatrica
gica Zanturri
Lenti vischi
(algine)
(rambuti)
assoni atterri

IV massaggio vibratorio con il "Vedee" per 5-10 minuti nella regione dolente

V veratrina gram. uno
vaselina gram. trenta
S. strofinazioni mattina e sera

VI fiale di acido fenico scab
iniezione una al giorno nella gamba dolente

VII solug di adrenalina al 1% iniezioni di 1 cc. per volta

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Servono a prepararsi da sé l'acqua alcalina gasosa. Molto economici.

19 Mercoledì S. TECLA AGOSTO S. BERNARDO Giovedì 20

Singhi 10720

I
 1. *draghi sili di (36% prolungati) con ap-
 licazioni di compresse fette sul capo
 etarizato di morfina centigr. cinque
 solfati di atropina milligr. cinque
 acqua distillata gram. cinque
 2. quattro goccie in un cucchiaino d'acqua quattro
 volte al giorno e nella notte etiche-
 rini di gram. mezzo di bromuro potassio
 con goccie cinque di laudano.*

II
 un cucchiaino di caffè di colore di bicor-
 bonato di soda in meno bicchiere di
 acqua e subito dopo bevuta l'acqua si beva
 una soluzione carica di acido citrico-

III
 citrato sodio gr. due
 aq. distillata gr. duecento
 In un cucchiaino di zuppa per adulti tre
 a quattro volte al giorno prima di pasto -
 e un cucchiaino di caffè per i bambini
 prima di ogni pappa.

SCIROPPO PAGLIARI

Purgante Comodo
Efficace - Sicuro

21 Venerdì

S. GIOVANNA

AGOSTO

S. FILIBERTO

Sabato 22

Scarlattina

acqua distillata e sterilizzata gram. uno
bissolodrato di chinino centigr. trenta

L'iniezioni 1/10 di siringa trovar per una
solo volta, aumentando di 1/10 per ogni
due anni di età.

Solòku (morsicatura di Topo)

iniezione endomuscolare ~~1/10~~ di novabro
cent. 15 e dopo otto giorni se occorre
si pratica una seconda di cent. 30

VICHY-CÉLESTINS

GO *Solvono il* DIABETE RENELLA

23 Domenica S. FILIPPO B. AGOSTO S. BARTOLOMEO Lunedì 24

Lifilide

I
 del cianuro di mercurio centig. venti
 cloridato di stercarina centig. quaranta
 acqua distillata gram. venti
 a cucchiaio due d'una siringa al giorno per iniziare e per 60 giorni
 al giorno

II Vanianine flac. di confetti

per la cura radiante. Due confetti a metà colazione e due a pranzo
 iniziali in endovena per tre settimane e poi si sospendono per
 dieci giorni, indi si ripiglia la cura e per
 i mesi di aprile e maggio, settembre ed ottobre
 di 2. Paolo Locatelli
 cura di interini Per i bambini di 12 anni un confetto,
 per quelli di 15 anni due confetti al giorno.
 Di solis e psorissio se si pronuncia fuori dei pasti è sufficiente
 se qualche barbone di porre la cura da

Prota ioduro ura esete fatta lontana almeno 20 giorni
 di mercurio no della cura mercuriale. Cadendo alla
 centig. trenta da vai debole dell'urina/albucina per
 este di salsapari ma d'interrompere questa cura, esol
 glia di legno san periodo mestruale nelle donne
 lo e di opio

con centig. trenta la presenza, nella faccia interna dei piedi
 m. sf. p. di Ba grossi noduli superiori dei due lati, di cui
 d'una lesero prominente mamillare più o meno sviluppa
 prima di corisarti da e rivelata, e che sarebbe il rudimento di una
 cuspidi supplementare, è segno certo di sifilide
 lide ereditaria in un bambino.

25 Mart

S. L.

BAGALADI, 7.

192

(Reggio Cal.)

AGOSTO

SECONDO Mercoledì 26

Scottatura

1
aristolo
gr. 5 a 10
olio di oliva
gr. venti
+ 1/2 libbra e la collina
gr. quaranta

del balsamo del Perù, nitrato di argento
lo cristall. vasellina e lanolina in gran. 10
antipirina gram cinque
medicare una volta al giorno.

41
soluzione acquosa
di glicerina
Lungo
Vintura di lido
si pennellano le
flettere, poi con pie
colle punturino
lano e si ricopre
con garza sterile
si rinnova ogni
4 giorni e dopo
la 3^a medicatura
si avvia la guarigione
grasse - se l'uscita
lun 2 di Sigardo
appena appariscono
le vescicole o i
nodi si ricoprono
con unguento
V

soluzione di sapone bianco di marsiglia 2 1/2 a 5 %
di acqua bollita
con garza imbevuta nella soluzione si pulisce
si pulisce la lesione ed i suoi contorni fino
a che la garza esce pulita, cioè priva di pus o di
flettere, poi si prende una compressa di garza imbevuta
in una soluzione al 20 % e in caso di divergenze
za si sprege sulla garza vigorosamente un
pezzo di sapone bagnato, indi si accarezza
fra le palme delle mani la striscia di garza
fino ad ottenere una schiuma fine e
abbondante che riempie le maglie della garza
si preme col dito e si tampona la ferita
con uno strato dello spessore di un centimetro
Una buona strata di cotone idrofilo e da
Benda completano la medicatura.

Di questa medicatura serve per le ferite
antipirina gram cinque
Liscivare la piaga con acido borico e salato in gran. tre
parti di acqua bollita
si dolo ad acido fenico in gran. uno
ad umificare con compressa
sublimato corrosivo centigr. dieci
verbi a più in 20 di
acqua, ricoprire con
vasellina gr. cinque a dieci
garza e cotone idrofilo
nova ogni uno o due
giorni

si pulisce la lesione ed i suoi contorni fino
a che la garza esce pulita, cioè priva di pus o di
flettere, poi si prende una compressa di garza imbevuta
in una soluzione al 20 % e in caso di divergenze
za si sprege sulla garza vigorosamente un
pezzo di sapone bagnato, indi si accarezza
fra le palme delle mani la striscia di garza
fino ad ottenere una schiuma fine e
abbondante che riempie le maglie della garza
si preme col dito e si tampona la ferita
con uno strato dello spessore di un centimetro
Una buona strata di cotone idrofilo e da
Benda completano la medicatura.
Di questa medicatura serve per le ferite
antipirina gram cinque

Liscivare la piaga con acido borico e salato in gran. tre
parti di acqua bollita
si dolo ad acido fenico in gran. uno
ad umificare con compressa
sublimato corrosivo centigr. dieci
verbi a più in 20 di
acqua, ricoprire con
vasellina gr. cinque a dieci
garza e cotone idrofilo
nova ogni uno o due
giorni

si pulisce la lesione ed i suoi contorni fino
a che la garza esce pulita, cioè priva di pus o di
flettere, poi si prende una compressa di garza imbevuta
in una soluzione al 20 % e in caso di divergenze
za si sprege sulla garza vigorosamente un
pezzo di sapone bagnato, indi si accarezza
fra le palme delle mani la striscia di garza
fino ad ottenere una schiuma fine e
abbondante che riempie le maglie della garza
si preme col dito e si tampona la ferita
con uno strato dello spessore di un centimetro
Una buona strata di cotone idrofilo e da
Benda completano la medicatura.
Di questa medicatura serve per le ferite
antipirina gram cinque

Malattie dello
Stomaco e degli Intestini

VICHY-HOPITAL

27 Giovedì s. CESARIO AGOSTO s. AGOSTINO Venerdì 28

Suropolature della cute delle mani
 In mentolo gram. uno
 salolo gram. mezzo
 olio di oliva gram. dieci
 lanolina gram. trentadue

1. ungere la parte lasciando la po-
 mata insida per alcuni minuti,
 indi si asciughi leggermente con cotone.

Bisquicine

1 Foglie di zena gr. trenta
 rabarbaro corsuro gr. cinque
 in sq. e 11 di cui

1. us. al mattino per infuso a cal. di giu-
 Duemila dopo di avere assunto un
 uccellino in cifi

bi Solfato di sodio gr. cinquanta
 bicarbonato di sodio gr. trenta
 cloruro di sodio gr. due
 essenza di cedro j.b. per aromatizzare

1. cotture. Neol-dotta parti 2: acqua sterile parti 10

si trova presso il laboratorio di Domenico Ma-
 estretti Viale Monte Nero
 Milano 1131

compresse di garza sterili immerse in tale
 soluzione applicate ogni 24 ore sulla lesi-
 one e ricoperte con gutta-perca, diminuita la
 secrezione parolenta e comprese le granula-
 zioni: medicatura a giorni alterni: o meglio
 si copre la lesione con garza neolata
 e sopra con compresse al neol-dotta

I

Mibicheroa abituale
podofillino centigr. venti
rabarbaro e pulvere di bella donna centigr. tre
aloe centigr. dieci
estratto di ginsengiano quanto basta per
fare pillole dieci
d. una la sera prima di coricarsi
oppure

II (a)

magnesa usata gram. venti
polv. di belladonna e di nore vomica in gram. uno
teobromina gram. dodici e mezzo
m. ef. carb. n.° cinquanta

(b)

d. Due al giorno un'ora prima del pasto
ogni 3 o 4 giorni un cucchiaino di
sale Montecatini.

III

foglie di rosa gr. trenta
rabarbaro contuso gr. cinque
m. ef. n.° 10

d. una al mattino per infuso a cal. di gr. 200
aggiungendo un cucchiaino di caffè
di solfato sodico gr. cinquanta
bicarbonato sodico gr. trenta
cloruro sodico gr. due
essenza di cedro q.b. per aromatizzare

IV

In individui che da 9 giorni non aveva potuto
emettere feci si è ottenuto brillantissimo
lascio con iniezioni di endopituitina. Il
titolo di eteroterapico milanese

Per impedire le FRODI

e le sostituzioni bisogna aggiungere sulle ricette alla parola VICHY il nome della Sorgente.

31 Lunedì

S. RAIMONDO

AGOSTO

Memorandum

Spermatorea atonica

℞ Ergostina Bonjean e canfora rasa

aa gram. 400

creta preparata e gomma arab. qb. per pillole trenta

1. Due a quattro al giorno.

Per facilitare il secondamento subito dopo

il parto si pratici iniezioni

di pituitaria frale da 5 centimetri 3.

Se dopo 12 iniezioni non si ottiene

l'espulsione della placenta, allora si è

autorizzato di ricorrere al distacco manuale.

Riassunto di AGOSTO

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1	solfato di zinco		Sudore dei piedi e delle mani	
2	ed. ferro		Borace ed acido salicilico aa gram. quindici	
3	gr. 2,25		acido bórico gram. cinque	
4	" di rame		glicerina ed alcool diluito aa gram. sessanta	
5	gr. 0,75		per frizioni tre volte al giorno.	
6	caffè			
7	gr. 102			
8	ess. timolo			
9	gr. 2		Sudore dei piedi	
10	acido iposolforoso		acetato di piombo cristallizzato centigr. venti	
11	sf. rosso		estratto di genciana g. b. per fare pillole quattro	
12	gr. 3		una ogni sei ore	
13	aq. distillata		oppure	
14	gr. 1250		polvere di agarico bianco centigr. venticinque	
15	lavaggi		" di radice di belladonna centigr. tre	
16	(b)		acido canforico centigr. venti	
17	permanganato potassico		polvere di foglie di iaborandi centigr. due	
18	gr. cinque		m. of. cachet. us.	
19	aq. distillata		da prendersi la sera andando a letto.	
20	e alcool reb.			
21	gr. 250			
22	lavaggi			
23	(c)		estratto fluido d'iodio gram. venti	
24			d. dieci a quindici volte due volte al giorno.	
25			Ab. questa prescrizione serve ancora contro	
26			la polsiuria.	
27	III			
28			Solfato neutro di atropina centigr. uno	
29			f. c. N. 20	
30			una polvere o due la sera	
31	IV			
			Sapone a freddo di foglia o sommità frastile	
			di salvia q. s. 5%	
	V			
			tannipermio e sotto citrato di bismuto ing. dieci	
Totale			TOTALE	

STITICHEZZA — GRAINS DE VALS

!!! Morfornio f. 15 vende presso Lancillotti e Napoli

FERRO PAGLIARI CLORURO FERROSO INALTERABILE

1° Martedì S. ISABELLA SETTEMBRE S. ANTONINO Mercoledì 2

Volendo fare a meno
del bagno
Piramisone

Zifo

cost. 10 ogni 2 ore	Cloria acqua pura - disinfezione dei serri
cost. 15 ogni 3 ore	gati ed escreti con latte di colata - disinfezione della biancheria con acqua di
abbassata la tem.	peratura si sospende il bagno e bollitura per 30 minuti
salvo a riprendere	se necessario di camera ogni giorno. Dieta latte
se vi sarà di più	della finitura di iodo goccia venticinque

7

ioduro di potassio gram. uno
acqua zuccherata gram. cento
da consumarsi nelle 24 ore

così la lingua si pulisce, cessa la diarrea e l'odore fetido delle feci, si abbassa la temperatura - con questa cura si potranno impiegare altri mezzi come bagni, lozioni, insiezioni eccitanti, oppure

11 (a)

acqua 4 o 5 litri per disinfezione e come colagogo e diuretica una cartina di calomelano a sapone da 30 a 60 centigr.

(b)

salato centogr. quindici a trenta lattosio gram. sei

(c)

f. 3 cartine da prender nella giornata latte gram. 250 ogni tre ore con porzioni diuretiche e brevi lassi ogni intervalli in modo da raggiungere 3 o 4 litri di liquidi al giorno

(d)

nei giorni che non si dà calomelano tintura di iodo soluz. di acido arsenioso 1% in gram. 80

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

3 Giovedì

S. CECILIA

SETTEMBRE

S. ROSALIA

Venerdì 4

ioduro di potassio gram. mezzo
 solfato di stricnina centigr. uno
 acqua distillata e bollita gram. cinquecento
 I. un bicchierino da liquore mezz'ora prima di letto
 (e) Ogni 6 ore e poscia ogni 12 ore un clistere
 di acqua fredda gram. cinquecento a sfascio
 a bassissima pressione
 (f) Collutorii di clorato potassio, a borato 20
 dico o salicilato sodico
 (g) sette narici mattina e sera s'introduca
 un granulo
 di vasellina gram. venti
 acido borico gram. due
 resorcina e mentolo in centigr. due
 oppure
 III (a) iodo metallico centigr. dieci
 ioduro potassio gram. mezzo
 acqua bollita gram. duecento
 b. ogni due ore un cucchiaino in un po'
 d'acqua zuccherata, consumando sei
 cucchiainate al giorno.
 (b) iodo metallico centigr. cinque
 ioduro potassio centigr. venti
 acqua bollita gram. centocinquanta
 4 per enterocoliti al mattino presto ed alle
 17 di ciascun giorno previa lavaggio con acqua
 ne di melonata canuta dell'enterocoliti per
 sei volte e l'enterocoliti sia fatto a bassa pressione
 iniezioni di electroargolo

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA
TOSSE

5 Sabato s. GENTILE M. SETTEMBRE s. PETRONIO Domenica 6

V

Dopo aver sciolto l'infusione con calore
lento ad olio di ricini, si prepara un conte
racellina di olio di oliva, o di decotto di ce
mi di lino (non meno di mezzo litro) con
30 goccie di essenza di trementina. Prehan
deracellina si ripete il giorno successivo
e si continua a giorni alterni riducendo
alla metà l'essenza di trementina.

Contemporaneamente si prende, ogni due ore,
un cucchiaino

di glicerina neutra gram trenta
acqua di menta e di anice gram duecento
sciroppo di cedro o di zorrina gram quattro
Casi trattati la febbre tifoide, la cefalalgia
comparsa quasi sempre del secondo giorno
di cura, la lingua diviene chiara e u
mida, l'infante prova un benessere ge
nerale, la malattia viene abbreviata

VI

iado metallico, iaduro polveroso, acqua di bibita
aa gram due
alcol gram quarantotto

Si dice 3 goccie ogni due ore negli adulti, nei
bambini la metà, in un bicchiere di latte
freddo limonato, acqua zuccherata, un
giorno e notte; si diminuisce la dose adde
vuta la migliorata fino a 20-30 gocce al giorno
fino a 3-4 giorni dopo caduta la febbre

ESTRATTO PANERAJ contro i CATARRI CRONICI E ACUTI

9 Mercoledì B. SERAF.^{NA} V. SETTEMBRE S. NICOLA Giovedì 10

III. Solpuro di potassio gram tre sapone verde gram 30
frizionare due o tre volte al giorno e riscoprire
la regione con pernole unida giorno e notte

- I
- (a) Tigna del cuoio capelluto e della barba
di far cadere le crasche con polverizzazioni
in tiepide di soluzione acquosa di resorcina all'
rettora bene con la regione pernetatura mit
donna e resa di
- (b) tintura di iodo gram cinque
alcol a 60° gram quarantacinque
- (c) asciugata la tintura si usi la pomata di
calomelano a vapore gram uno
vasellina gram trenta
oppure
- c-bis) ossido giallo di mercurio gram uno
vasellina gram cento
- 11) raphano gram tre sapone verde gram cento
alcol a 90° gram dieci: applicare una volta
al giorno dopo le crasche

Lenia

Oltre del Sanifugo Nicolani o Scarpiatti
un trattamento più rapido è il seguente:

Al mattino a digiuno si amministrano
per bocca 60 goccie di etere solforato in
gram cento di acqua e dopo 10 a 15 minuti
di gram 50 a 60 di olio di ricini.
Se con ciò non verrà espulsa la pietra del
la lenia si ripeterà la cura nel giorno
seguente.

Durante i pasti
bisogna bere la

VICHY-CÉLESTINS

11 Venerdì S. GIACINTO SETTEMBRE S. GUIDO Sabato 12

Cetano

1

acido fenico gram. cinque
glicerina bidistillata gram. cento
d. iniezioni intramuscolari.

oppure secondo il Braccelli

11

acido fenico gram. due
glicerina bidistillata gram. cento
d. iniettare mezza o una siringa secondo
l'età ogni 2 o 3 ore fino all'attenua-
arsi dei fenomeni tetanici.

111

oppure secondo L. De Montille

olio di oliva sterilizzato gram. dieci

acido fenico sciolto nell'etere gram. uno

S. In siringhe di Pravaz al giorno, se

i fenomeni sono imponenti si potrà as-

si curare fino a cinque, per iniezioni

intramuscolari. Si somministrano con-

tra delle dosi di idrato di cloralio.

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

13 Domenica NOME M. V. SETTEMBRE ES. S. CROCE Lunedì 14

	Tintura di iodo inalterabile	
(a)	iodo metallico gram. uno ioduro sodico centigr. trentacinque alcool a 80° gram. dieci	
(b)	oppure iodo metallico gram. dieci ioduro potassico gram. quattro alcool a 80° gram. cento	
(c)	oppure Tintura di iodo gram. dieci acido iodico cristallizzato centigr. tre e cinque	
(d)	oppure in forma più attenuata iodo metallico gram. dieci ioduro sodico gram. tre e mezzo alcool a 80° gram. ottocentocinquanta	

RICETTA PER I CAPELLI GRIGI

Mr. Frank Harbaugh, parrucchiere da circa 40 anni, consiglia la seguente ricetta che tutti possono preparare a casa loro con poca spesa; si tratta di una semplicissima soluzione che renderà ai capelli grigi o decolorati il loro colore naturale.

« In un flacone da 250 grammi versate 30 grammi di Acqua di Colonia (3 cucchiaini da tavola), 7 grammi di Glicerina (1 cucchiaino da caffè), il contenuto di una scatola di Composto Lexol e tanta acqua comune fino a riempire il flacone. Le sostanze occorrenti possono essere acquistate con poca spesa in tutte le farmacie, nelle migliori profumerie e presso tutti i parrucchieri e la mescolanza è molto semplice. Fatene l'applicazione due volte per settimana fino ad ottenere per i vostri capelli il colore desiderato. Questa preparazione non è una tintura e non colora il cuoio capelluto il più delicato; non è grassa e si conserva indefinitivamente. Con questo mezzo tutte le persone coi capelli grigi ringiovaniranno di almeno 20 anni. Il Lexol fa sparire la forfora, rende i capelli morbidi e brillanti e favorisce la loro crescita ».

VICHY-HOPITAL

AFFEZIONI DELLE
VIE DIGESTIVE

15 Martedì s. NICOMEDE SETTEMBRE s. EUFEMIA Mercoledì 16

1 Tricofizia del cuoio capelluto e della barba
 linsusa di dolo pura o attenuata con glicerina
 pennellature sul cuoio capelluto

Per la barba
 27/101 bicloruro di mercurio centigr. venti
 formole centigr. settantacinque
 aceto gram. dieci
 alcool camforato gram. cent.

(b) Si doubheranno le parti ammalate due vol
 te al giorno e per la notte si applicherà
 vasellina gram. venti
 iodo metalico centigr. venti

GOCCE JODO-FERROSE PAGLIARI

Soluzione titolata inalterabile

17 Giovedì s. COLOMBA SETTEMBRE s. COSTANZO Venerdì 18

Artrosinosite subacuta
 rodo metallico gram. uno
 ioduro potassico gram. tre
 guaiacolo gram. due e mezzo
 glicerina bidistillata gram. cinquanta
 d. uso ipodermico nella zona ammalata

1 Tonsillite
 mentolo gr. uno
 saleto gr. tre
 alcool etilico gr. cento

Si usi in un bicchiere di acqua
 per gargarismi

11 neof. Botte /
 di prescrizione una volta al giorno
 e gargarismi con una medicina di neof
 in un bicchiere di acqua

PASTIGLIE VICHY-ÉTAT

Preparate coi
Sali Naturali

19 Sabato s. TEODORO SETTEMBRE FESTA CIV. Domenica 20

Tubercolosi polmonare

(a)

Le nel primo stadio, giuoco moltiplicato
Kochlisina (formula A) del Prof. Pier Nino
La Gregorati in Napoli, Santa Caterina de' Ricci
l'iniezione con Decimo di siringa nella regio-
ne glutea per arrivare a due Terzimi nel
quarto giorno, e continuando con la cura.

(b)

Emulsione d'olio di fegato di merluccia
tre volte al giorno con i past. ma a
preferenza Laurano esser di resine
grasse, così prosciutto-lardo-buro-latte
nova, una bianca sguociale
oppure (formula Buzante)

75 (a)

iodo metallico gram. due
ioduro sodio gram. quattro
canfora gram. due
guaiacolo gram. dieci
aq. sterile e glicerina bidistillata in gram. cinq. tanta
iniezioni intramuscolari

(b)

oppure (medicatura Buzante)
iodo metallico gram. uno a cinque
guaiacolo gram. uno a cinque
ioduro sodio 7.6 per s. s. g. l. i. n.
glicerina neutra gram. quaranta
acqua distillata e sterilizzata gram. cinquanta
iniezioni intramuscolari

(c)

Emulsione e iniezioni come sopra
Aria di montagna nelle pinete e bagno
di raggi solari

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO
INALTERABILE

21 Lunedì s. MATTEO SETTEMBRE s. MAURIZIO Martedì 22

III

Lichenina a creosoto e mosto di Napoli
Lombardi e Lombardi - Via Roma 34.5 Napoli

IV

Grati Wassermann

scab. 1/2

Iniezioni prof. di intracavità

Zuberlini orna

V

neobios - scab. 1/2

Iniezioni

Orsini a Roma la Direzione è l'esperto
D. M. P. A.

Medicament chimico farmaceutici

Via Altamura 4-10. o Largo Brindisi 15-2
Roma 1909

VI

Tubercolo intestinale

Tiocol di acido gramme cinque

solfato di chinina cent. gr. cinquanta

polvere di Gasser cent. gr. trenta

m. q. c. dieci

di una su notte al giorno primo de part.

RENI
VESCICA

VICHY-CÉLESTINS

23 Mercoledì S. LINO SETTEMBRE S. GERARDO Giovedì 24

Ulcera cronica vulvare

I
Nel 1° giorno iniezione di neosalvarsan centigi. quindici
nel 5° giorno iniezione di neosalvarsan centigi. trenta
nel 10° giorno altra di centigi. quaranta

ulcera mella

II
Dopo un accurato lavaggio
acido salicilico gram. uno
tintura di benzoino gram. due
vasellina gram. trenta
uso esterno.

III
oppure
tintura di iodo e glicerina aa gram. cinque
il pennellatura una volta al giorno

ulcera varicosa

IV
balsamo del Perù gram. uno
nitrate di argento cristallizzato gram. due
vasellino lanolina aa gram. quattro
uso esterno

N.B. guarita l'ulcera spolverare la parte con
dermatolo

GOCCE FERRO-ARSENIOSE PAGLIARI

Soluzione titolata inalterabile

25 Venerdì S. FIRMINO SETTEMBRE S. CIPRIANO Sabato 26

Uricemia

I

urodenat di S. L. Chatelein. Anilopa e siteri
Sdra. iolo. orella
cura secondo istruzione a stampa

II

per calmare i dolori
urotropina gram. quattro
piperazina gram. tre
m. ef. cast. le. n.° dieci
1. tra al giorno
At. come lo evitare: il tabacco il vino, il caffè,
gli esseri secchi, le carni sece e rase, il
salame, il latte seccato, le uova, gli aromi,
l'aceto e l'aceto di vino, l'aceto

III

urosolvina De Simone
Due cucchiaini da caffè in acqua 15 minuti
prima del pranzo

IV

Piperazina m. dy. fin
Da uno a quattro cucchiaini da caffè in un
bicchiere di acqua la mattina a digiuno e
la sera prima di dormire

V

urotropina gram. cinque
salato gram. quattro
gli erosofato di calcio gram. tre
m. ef. d. verb. due al giorno un'ora prima del pasto

Dopo i pasti
DUE o TRE

PASTIGLIE VICHY-ETAT

facilitano
la digestione

27 Domenica s. ADOLFO M. SETTEMBRE s. VENCESLAO Lunedì 28

Unghia incarnata
si bagnano tanto le parti molli infiam-
mate che il bordo dell'unghia ogni gior-
no con un tampone imbevuto di
una soluzione diluita di cloruro di ferro
lasciando che esso agisca per un certo tem-
po. Tale applicazione, che non provoca
dolore, fa disseccare le parti molli
dal bordo ungueale che, anzi esse,
viene rammolito dal cloruro di ferro.
N.B. Per evitare recidive occorre una cal-
zata igienica, pulizia costante della pe-
de, e i successivi tagli dell'unghia non
si facciano arrotonditi, bensì in modo
che le parti laterali oltrepassino la pal-
pa del dito.

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

“ ANTICOL ”

29 Martedì s. MICHELE SETTEMBRE s. GEROLAMO Mercoledì 30

Urticaria

per calmare il violento prurito

mentolo con Lieci

alcool. carbonato, clorofarmia ed etex solforica in gram. 100

A. uso esterno

Riassunto di SETTEMBRE

Date	INCASSI		SPESE	
	Ammontare delle visite e consultazioni fatte	Somme incassate	Osservazioni	Somme spese
1		Vaiuolo		
2		Appena manifestata l'eruzione		
3		fino all'inizio dell'essiccamento		
4		delle pustole, si adoperano iniezioni		
5		si sottocutanee giornaliere di		
6		soluzione di nucleinato di sodio al 10 o 15%		
7		di 15. Per gli adulti nelle forme gravi si		
8		iniettano 2 o 3 gram. al giorno, nelle		
9		forme di media gravità 1 o 2 gram.		
10		per i bambini da gram. mezzo ad uno.		
11				
12		Ricerca di vermi con anelli di urina		
13		a 10 cm ³ di urina di recente emessa		
14		e scaldata alla ebollizione si addiziona		
15		una dieci gocce di soluzione di		
16		nitrato mercurico (1 gram. in 10 gr.		
17		di acqua sterile). L'urina normale		
18		diventa lattescente e deposita rapi-		
19		damente un precipitato bianco; in		
20		vece l'urina di soggetto affetto da		
21		elmintiasi (ascaridi, ossiuri, tenia) as-		
22		sume una colorazione grigia, che		
23		può arrivare fino al nero; allora		
24		si potrà somministrare un anti-		
25		elmintico (santonina, ascaridoli,		
26		butolan, helminol) -		
27				
28				
29				
30				
Totale			TOTALE	

PASTIGLIE PANERAJ

IL MIGLIOR RIMEDIO
CONTRO
LA TOSSE

1° Giovedì

S. REMIGIO

OTTOBRE

S. ANG. CUST.

Venerdì 2

Vaginite cronica
Irrigazioni al permanganato di potas-
sio un grammo in mille di acqua ste-
rile e sull'intervallo tenere in pos-
sione dei tamponi imbevuti di
I Dermatole e iodofornio a gram. cinque
varellina gram. venti.
e se tale medicatura riesce insu-
perabile unire con
II Benzoino, canfora e cubeba a gram. cinque
varellina gram. venticinque
III *Pagine 1/2 due*
Atcool Althia 10 capsule al giorno sull'intervallo di pasti
gr. 170
Istruzione di iodo se vi è abbondante secrezione, an-
che un litro di acqua sterile con due
gr. 50
Istruzione di iodo a quattro litri di acqua sterile con due
gr. 50
Istruzione di iodo per mille di solfofenato di zinco
IV Solfofenato di zinco gram. duecento
gr. 50
L'usa in due litri o due in quattro litri
di acqua sterile per irrigazione vaginale.
V *Gyaldose Mac*
Una cucchiaino di caffè in un litro di ag-
uardiente tiepido per irrigazione vaginale
VI *Alcun...*

Non dimenticare
di indicare chiaramente

VICHY-ÉTAT

nel prescrivere le Acque
ed i Prodotti di Vichy

3 Sabato

S. CANDIDA

OTTOBRE

MAD. ROSARIO

Domenica 4

Verzuckte / birritte in diasetto calabrese /

F. *perzuckeltes* di acido cronico

II. *solfato di magnesio gr. trenta*

l. c. n. sessanta

*L'acqua di Vichy con i sali principali
non si potrà sostituire al semplice di ac-
quosa la magnesio californica nella
stessa dose.*

*La non si ottiene l'effetto di sostituirsi
con l'acido cronico o con l'acido nitri-
co, o con acido salicilico o acido
lattico con gr. unanallo di un gr. otto*

ESTRATTO PANERAJ

IL MIGLIOR PREPARATO
DI **CATRAME**

5 Lunedì S. PLACIDO OTTOBRE S. BRUNONE Martedì 6

I

Vescica (calarro del collo della)
benzoato di sodio gram. dodici
benzoato e carbonato di litina in gram. tre
bicarbonato di sodio gram. venticinque
m. ef. cartina N. 29

d. una in un bicchier d'acqua a giorni alterni
se vi è acido

II

benzoato di litina e magnesia usta in gram. cinque
urotropina gram. quattro
m. ef. cartina N. 20

d. una in acqua ogni mattina
oppure

III

perle di sandalo e salolo flac.

d. tre al giorno un'ora prima dei 3 part.

IV

Decozione di barba di mais 4/10

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Servono a prepararsi da sé l'acqua alcalina gassosa.

Molto economici.

7 Mercoledì S. AUGUSTO OTTOBRE S. PELAGIA Giovedì 8

vomito insuperabile delle gravide

La donna sarà trasportata in una clinica dove per alcuni giorni saranno proibite le visite dei familiari; durante le prime 24 ore sarà tenuta a digiuno e si faranno per alcuni giorni enteroclistemi di fosfo di soda con solfato di soda / infuso di fosfo di soda: gr. 2000 solfato di soda gram. cinquantaf. si prelevano edli emulsi con e acqua bollita, fino a soddisfacente effetto e ogni giorno si farà una ipodermoclisi di un litro di siero fisiologico, e, se necessario, si faranno 2 o 3 iniezioni di 4,00 solfato di stricnina.

al mattino del 3° giorno un clistere emulso e dopo mezz'ora un clistere di clorofio gram sei, emulsi di gram. aralia gram. scipta, poi le si somministrerà a sei latte puro o con acqua di Vichy, e così si proseguirà per tutta la durata del corso clorofio, e nei giorni successivi si aggiungerà al latte farina, biscotti.

a capo di 4 o 5 giorni si istituirà limitazione calda per 6 a 8 giorni, e indi si rilocca gradualamente all'alimentazione normale.

Nota. Tale metodo è consigliato dal Dr. J. H. Rotay di Bruxelles

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

9 Venerdì S. DIONISIO OTTOBRE S. EULAMPIA Sabato 10

Vomito nei bambini lattanti

I tintura di belladonna gr. 12 dieci
bicarbonato sodico bicarbonato di sodio gram. uno
e creta preparata bicarbonato di sodio gram. uno e mezzo
s. q. due sciroppo semplice gram. trenta
m. f. c. n.º 90 acqua bollita gram. sessanta
una tre volte uno o due minuti prima del latte
al giorno in un bicchiere quattro cucchiaini
poco di acqua da caffè al giorno (una per volta) fino a
zuccherala più tre mesi di età da tre a sei mesi
da della poppata si dia sei cucchiaini da sei a dodici
si mesi quattro cucchiaini da frutta
N.B. quando non vi è diarrea o febbre si continui l'abitudine alimentare
oppure
emulsione di gomma arabica gram. cinquanta
tintura di iodo gr. 12 sei
sciroppo di clorato gram. dieci
un cucchiaino da caffè prima del latte
oppure nel vomito incoercibile
latte fortemente zuccherala
oppure
IV citrato di soda di recente preparato gram. cinque
sciroppo semplice gram. cinquanta
acqua bollita gram. duecento
un cucchiaino prima di ogni poppata
N.B. il vomito cesserà in 24 o 48 ore, in
contrario si cambi la nutrice, e se ciò
è impossibile si sopprima l'allattamento

VICHY-CÉLESTINS

GOTTA
DIABETE
RENELLA

11 Domenica s. LUDOVICO OTTOBRE s. SERAFINO Lunedì 12

lo e si dia latte sterilizzato addiziona-
to con il citrato di sodio.

V

acqua cloriformica gram cento
cloridrato di morfina mezzo milligram per anno ^{1/2} etia
bromuro di calcio gram tre ^{1/2} a centigr. due
acqua distillata gram trenta
un cucchiaino da caffè ogni due ore

VI

Doziane sistematica del Riverio ^{1/2} fl
di secondo istruzione a stampa

VII

citrato di soda gram uno
acqua distillata gram cento
un cucchiaino da caffè prima di ogni pasto

VIII

da dieci a quindici gram di zucchero
in cento gram di alimenti - se il bambino
è allenato al seno, si aggiunge alla sua ra-
zione alimentare dell'acqua zuccherata
somministrata con il cucchiaino -

IX

tavolette di citrosodina Grémy
 di una tavoletta sciolta in poca acqua
 prima di ogni succhiata -

FERRO PAGLIARI

CLORURO FERROSO
INALTERABILE

13 Martedì s. EDOARDO OTTOBRE s. GERARDO Mercoledì 14

Alopecia (caduta dei capelli)

- I (a) spirito ragionato gallico gram. venti
1. con una piccola spugna imbevibile imbevibile
nella su scritto imbottita, si strofinano le parti
ove sono ingranditi i capelli e dopo essicca-
tate si strofinano con spugna imbevibile
(b) di olio di ricini gram. cinquanta
solfo di chinino gram. cinque

- II del bisolfato o cloridrato di chinino gram. due
acqua distillata gram. cento
sale comune di cucina peso un cucchiaino
acqua tiepida gram. cento
si unisce bene e si agita dopo con una
spugna imbevibile in detta soluzione si
strofina la parte ove cadono i capelli

- III tintura di capsico gr. cinquantina
1. per strofinare tre volte al giorno

- IV acido acetico glaciale e resorcina an gram. uno
cloralis idrato gram. quattro
formalina gram. cinque
olio di ricini gram. quarantina
alcool a 80° gram. duecento
essenza di violetta goccie cinque
1. frizioni

Malattie dello
Stomaco e degli Intestini

VICHY-HOPITAL

15 Giovedì S. TERESA OTTOBRE S. GALLO AB. Venerdì 16

Per rinforzare le leghe del parto, per accelere
lere la placenta e frenare l'emorragia
e facilitare l'espulsione dell'aborto.

I Sp. della Tenosina fl.

II fiale di Tenosina
uso ipodermico

adina visino

Sp. iodio mercurico gr. uno
ioduro potassico gr. tre
liq. ars. di Fowler gr. venti
acqua distillata gr. cinquanta
J. quindici fros a vent' volte al giorno
evitando gli acidi

Per impedire le FRODI

e le sostituzioni bisogna aggiungere sulle ricette alla parola VICHY il nome della Sorgente.

19 Lunedì

S. ANNIBALE

OTTOBRE

S. IRENE

Martedì 20

I *Stigmaria* nelle forze
Eschirogona Battista

II *Parafacellum Calcei*

III *Fiale di vinidina*

IV infuso di coca 10% gr. duecento
Sintura di coca gr. quattro
" di nolle vomica gr. sei
glicerina neutra gr. cinquanta

di un cucchiaino tre volte al
giorno prima di pasti principali

V *Eschirogona Battista*

GOCCE JODO-FERROSE PAGLIARI

Soluzione titolata inalterabile

21 Mercoledì S. ORSOLA M. OTTOBRE

S. DONATO

Giovedì 22

Febbre Spagnola e sua cura

La febbre spagnola o paragraipate predilige i giovani e massime le donne, i vecchi ed i bambini però non sono totalmente immuni, ma in essi la malattia è più rara e sempre meno grave. Essa è assolutamente grave in individui di cui polisarici e pleurici presentando varie forme apoplettiche, rapidamente mortali, come assume gravità nelle donne gestanti, specie a causa della esoftalmia e renali e della intossicazione acida. D'altronde è quasi sempre seguito da morte.

L'affezione più frequentemente si inizia con folti catarrali faringea, faringo-laringo-tracheite, poi appare la febbre, che arriva a 40° - 41° C. e, nei casi benigni, cade dopo 3 a 5 giorni con profusi sudori; altre volte la febbre si eleva dopo due o tre giorni di febbre più o meno limitata, alle altre volte la febbre dopo 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10 o 11 o 12 o 13 o 14 o 15 o 16 o 17 o 18 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 o 25 o 26 o 27 o 28 o 29 o 30 o 31 o 32 o 33 o 34 o 35 o 36 o 37 o 38 o 39 o 40 o 41 o 42 o 43 o 44 o 45 o 46 o 47 o 48 o 49 o 50 o 51 o 52 o 53 o 54 o 55 o 56 o 57 o 58 o 59 o 60 o 61 o 62 o 63 o 64 o 65 o 66 o 67 o 68 o 69 o 70 o 71 o 72 o 73 o 74 o 75 o 76 o 77 o 78 o 79 o 80 o 81 o 82 o 83 o 84 o 85 o 86 o 87 o 88 o 89 o 90 o 91 o 92 o 93 o 94 o 95 o 96 o 97 o 98 o 99 o 100 o 101 o 102 o 103 o 104 o 105 o 106 o 107 o 108 o 109 o 110 o 111 o 112 o 113 o 114 o 115 o 116 o 117 o 118 o 119 o 120 o 121 o 122 o 123 o 124 o 125 o 126 o 127 o 128 o 129 o 130 o 131 o 132 o 133 o 134 o 135 o 136 o 137 o 138 o 139 o 140 o 141 o 142 o 143 o 144 o 145 o 146 o 147 o 148 o 149 o 150 o 151 o 152 o 153 o 154 o 155 o 156 o 157 o 158 o 159 o 160 o 161 o 162 o 163 o 164 o 165 o 166 o 167 o 168 o 169 o 170 o 171 o 172 o 173 o 174 o 175 o 176 o 177 o 178 o 179 o 180 o 181 o 182 o 183 o 184 o 185 o 186 o 187 o 188 o 189 o 190 o 191 o 192 o 193 o 194 o 195 o 196 o 197 o 198 o 199 o 200 o 201 o 202 o 203 o 204 o 205 o 206 o 207 o 208 o 209 o 210 o 211 o 212 o 213 o 214 o 215 o 216 o 217 o 218 o 219 o 220 o 221 o 222 o 223 o 224 o 225 o 226 o 227 o 228 o 229 o 230 o 231 o 232 o 233 o 234 o 235 o 236 o 237 o 238 o 239 o 240 o 241 o 242 o 243 o 244 o 245 o 246 o 247 o 248 o 249 o 250 o 251 o 252 o 253 o 254 o 255 o 256 o 257 o 258 o 259 o 260 o 261 o 262 o 263 o 264 o 265 o 266 o 267 o 268 o 269 o 270 o 271 o 272 o 273 o 274 o 275 o 276 o 277 o 278 o 279 o 280 o 281 o 282 o 283 o 284 o 285 o 286 o 287 o 288 o 289 o 290 o 291 o 292 o 293 o 294 o 295 o 296 o 297 o 298 o 299 o 300 o 301 o 302 o 303 o 304 o 305 o 306 o 307 o 308 o 309 o 310 o 311 o 312 o 313 o 314 o 315 o 316 o 317 o 318 o 319 o 320 o 321 o 322 o 323 o 324 o 325 o 326 o 327 o 328 o 329 o 330 o 331 o 332 o 333 o 334 o 335 o 336 o 337 o 338 o 339 o 340 o 341 o 342 o 343 o 344 o 345 o 346 o 347 o 348 o 349 o 350 o 351 o 352 o 353 o 354 o 355 o 356 o 357 o 358 o 359 o 360 o 361 o 362 o 363 o 364 o 365 o 366 o 367 o 368 o 369 o 370 o 371 o 372 o 373 o 374 o 375 o 376 o 377 o 378 o 379 o 380 o 381 o 382 o 383 o 384 o 385 o 386 o 387 o 388 o 389 o 390 o 391 o 392 o 393 o 394 o 395 o 396 o 397 o 398 o 399 o 400 o 401 o 402 o 403 o 404 o 405 o 406 o 407 o 408 o 409 o 410 o 411 o 412 o 413 o 414 o 415 o 416 o 417 o 418 o 419 o 420 o 421 o 422 o 423 o 424 o 425 o 426 o 427 o 428 o 429 o 430 o 431 o 432 o 433 o 434 o 435 o 436 o 437 o 438 o 439 o 440 o 441 o 442 o 443 o 444 o 445 o 446 o 447 o 448 o 449 o 450 o 451 o 452 o 453 o 454 o 455 o 456 o 457 o 458 o 459 o 460 o 461 o 462 o 463 o 464 o 465 o 466 o 467 o 468 o 469 o 470 o 471 o 472 o 473 o 474 o 475 o 476 o 477 o 478 o 479 o 480 o 481 o 482 o 483 o 484 o 485 o 486 o 487 o 488 o 489 o 490 o 491 o 492 o 493 o 494 o 495 o 496 o 497 o 498 o 499 o 500 o 501 o 502 o 503 o 504 o 505 o 506 o 507 o 508 o 509 o 510 o 511 o 512 o 513 o 514 o 515 o 516 o 517 o 518 o 519 o 520 o 521 o 522 o 523 o 524 o 525 o 526 o 527 o 528 o 529 o 530 o 531 o 532 o 533 o 534 o 535 o 536 o 537 o 538 o 539 o 540 o 541 o 542 o 543 o 544 o 545 o 546 o 547 o 548 o 549 o 550 o 551 o 552 o 553 o 554 o 555 o 556 o 557 o 558 o 559 o 560 o 561 o 562 o 563 o 564 o 565 o 566 o 567 o 568 o 569 o 570 o 571 o 572 o 573 o 574 o 575 o 576 o 577 o 578 o 579 o 580 o 581 o 582 o 583 o 584 o 585 o 586 o 587 o 588 o 589 o 590 o 591 o 592 o 593 o 594 o 595 o 596 o 597 o 598 o 599 o 600 o 601 o 602 o 603 o 604 o 605 o 606 o 607 o 608 o 609 o 610 o 611 o 612 o 613 o 614 o 615 o 616 o 617 o 618 o 619 o 620 o 621 o 622 o 623 o 624 o 625 o 626 o 627 o 628 o 629 o 630 o 631 o 632 o 633 o 634 o 635 o 636 o 637 o 638 o 639 o 640 o 641 o 642 o 643 o 644 o 645 o 646 o 647 o 648 o 649 o 650 o 651 o 652 o 653 o 654 o 655 o 656 o 657 o 658 o 659 o 660 o 661 o 662 o 663 o 664 o 665 o 666 o 667 o 668 o 669 o 670 o 671 o 672 o 673 o 674 o 675 o 676 o 677 o 678 o 679 o 680 o 681 o 682 o 683 o 684 o 685 o 686 o 687 o 688 o 689 o 690 o 691 o 692 o 693 o 694 o 695 o 696 o 697 o 698 o 699 o 700 o 701 o 702 o 703 o 704 o 705 o 706 o 707 o 708 o 709 o 710 o 711 o 712 o 713 o 714 o 715 o 716 o 717 o 718 o 719 o 720 o 721 o 722 o 723 o 724 o 725 o 726 o 727 o 728 o 729 o 730 o 731 o 732 o 733 o 734 o 735 o 736 o 737 o 738 o 739 o 740 o 741 o 742 o 743 o 744 o 745 o 746 o 747 o 748 o 749 o 750 o 751 o 752 o 753 o 754 o 755 o 756 o 757 o 758 o 759 o 760 o 761 o 762 o 763 o 764 o 765 o 766 o 767 o 768 o 769 o 770 o 771 o 772 o 773 o 774 o 775 o 776 o 777 o 778 o 779 o 780 o 781 o 782 o 783 o 784 o 785 o 786 o 787 o 788 o 789 o 790 o 791 o 792 o 793 o 794 o 795 o 796 o 797 o 798 o 799 o 800 o 801 o 802 o 803 o 804 o 805 o 806 o 807 o 808 o 809 o 810 o 811 o 812 o 813 o 814 o 815 o 816 o 817 o 818 o 819 o 820 o 821 o 822 o 823 o 824 o 825 o 826 o 827 o 828 o 829 o 830 o 831 o 832 o 833 o 834 o 835 o 836 o 837 o 838 o 839 o 840 o 841 o 842 o 843 o 844 o 845 o 846 o 847 o 848 o 849 o 850 o 851 o 852 o 853 o 854 o 855 o 856 o 857 o 858 o 859 o 860 o 861 o 862 o 863 o 864 o 865 o 866 o 867 o 868 o 869 o 870 o 871 o 872 o 873 o 874 o 875 o 876 o 877 o 878 o 879 o 880 o 881 o 882 o 883 o 884 o 885 o 886 o 887 o 888 o 889 o 890 o 891 o 892 o 893 o 894 o 895 o 896 o 897 o 898 o 899 o 900 o 901 o 902 o 903 o 904 o 905 o 906 o 907 o 908 o 909 o 910 o 911 o 912 o 913 o 914 o 915 o 916 o 917 o 918 o 919 o 920 o 921 o 922 o 923 o 924 o 925 o 926 o 927 o 928 o 929 o 930 o 931 o 932 o 933 o 934 o 935 o 936 o 937 o 938 o 939 o 940 o 941 o 942 o 943 o 944 o 945 o 946 o 947 o 948 o 949 o 950 o 951 o 952 o 953 o 954 o 955 o 956 o 957 o 958 o 959 o 960 o 961 o 962 o 963 o 964 o 965 o 966 o 967 o 968 o 969 o 970 o 971 o 972 o 973 o 974 o 975 o 976 o 977 o 978 o 979 o 980 o 981 o 982 o 983 o 984 o 985 o 986 o 987 o 988 o 989 o 990 o 991 o 992 o 993 o 994 o 995 o 996 o 997 o 998 o 999 o 1000

Questi ammalati sembrano dei mazzettei: congiuntive iperemiche, spesso

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

23 Venerdì S. SEVERINO OTTOBRE S. RAFFAELE Sabato 24

lagnie respiratorie frequenti ed assai, frequen-
ti epistassi, laringo-tracheite
tutta la faringe ed il palato molle
sono arrossiti e marcatamente pun-
teggiati in rosso.

Nella febbre spagnola è da notarsi
la frequenza delle complicanze pol-
monari e dopo delle complicanze nefriti-
che.

tra le complicanze respiratorie so-
no assai comuni le forme conge-
stive. Fin dai primi giorni e talo-
ra fin dalle prime ore in una lu-
ce polmonare si constata un sem-
plice indolimento del mormo-
rio vesicolare con o senza una
notevole quantità di rantoli fre-
quente è ancora la presenza di un
respiro indeterminato.

Questi fatti possono non andare più
oltre e risolvere dopo qualche giorno,
spesso invece dopo alcuni giorni, con
un rialzo di febbre, si osservano l'asvi-
luppo di fenomeni pneumotibici,
soffio bronchiale ecc.

L'altra complicanza frequente, cioè
la renale, si diagnostica dall'albu-
minuria, dalla cilindruuria, dall'eme-
turia (massime nelle donne) e

- 221 -

BIOGENOL PAGLIARI

Rigeneratore dell'energia
FISICA E MENTALE
A BASE DI SUCCHI ORGANICI

25 Domenica S. CRISPINO OTTOBRE B. CAMILLA Lunedì 26

starelli e dalla urobilinuria.
Di fatti nervosi sono da notare la
forma tipica, la meningocere-
brale ed il meningismo.

Altri fenomeni quasi innumera-
bili sono un'astenia generale
e i profusi sudori, che quando
sono accompagnati da rantali
nelli apici del polmone fanno
pensare a complicanza tuber-
colare, che spesso viene sostenuta
la dall'ulteriore corso morboso.

Terapie

Appena cominciano a presentarsi
le prime manifestazioni morbose,
occorre subito mettere mano alla
disinfezione delle prime vie respira-
torie (pratica inusitata come norma
profilattica). Si praticano collut-
tori e gargarismi con acqua tie-
pida iodata (cioè un cucchiaio
di tintura di iodo in un litro di
acqua), o con acqua ossigenata
(a 12 volumi) con sei parti di acqua.
Si somministra inoltre un purgan-
te preferibilmente oleoso.

Nelle prime 24 o 48 ore si può som-
ministrare un sudorifero: per
infuso di laboranti 3% gram. duecento

10 Centesimi il pacco
per un litro d'acqua

SALE VICHY-ÉTAT

27 Martedì s. FIORENZO OTTOBRE SS. SIM. E GIUDA Mercoledì 28

20 - salicilato di soda gram. Tre - lique
re azionato di ammonio gasse. Trenta
benzato sodio ^{uno meno} di ~~ammoni~~ e sviluppo di scorie
di granio amaro in gram. Trenta
due cucchiaini all'ora fino al
Vora o allo psialismo:
oppure. Sy. Decozione di tylio 3% gram.
Duecento - salicilato di soda gram. due
sciroppo di alkermes gram. Trenta - co
me per la precedente prescrizione.
Aggiungersi da tutti i preparati fig. a
aspirina, i quali determinando sudori
profusi prolungati aggravano la
tendenza all'adinamia generale e cardiaca.
Quando vi è tosse modica si aggiunge
alla decozione su indicata il benzato
di soda gram. due, e, se la tosse
è molto insistente, si calmi con la
sindura di acorido e di bella donna
o simili, come piccole e ripetute dosi
di codeina, perché occorre anzitutto
far riposare gli animali; e, oltre a
ciò, bisogna ricordare che la tosse
troppo forte favorisce una maggiore
diffusione del processo morboso nelle vie
respiratorie senza contare che ren
de più difficile l'espellorazione
perché nella tosse spasmodica si ha
appunto, durante gli accessi, uno

Contro Enteriti, Diarree
degli adulti e dei vecchi

"ANTICOL"

29 Giovedì S. ERMELINDA OTTOBRE S. AURELIA Venerdì 30

1) sono dei bronchi con relativa chiusa
 sura dei medesimi casi da rendere
 impossibile il passaggio e la emissio-
 ne dei prodotti di secrezione della
 mucosa i quali, invece, possono es-
 sere spinti verso i bronchi più pic-
 coli, determinando una maggiore
 diffusione del processo.
 È bene associare ai sudoriferi le inie-
 zioni di chinino la mattina e di cen-
 fora la sera per tenere alto il tono
 nervoso ed il cardiaco.
 Trascorse le prime 48 ore, si abbinano
 no gli antisettici sudoriferi, perché
 in questa affezione vi è la tendenza
 alle alterazioni renali, ove i precipi-
 ti salicici concorrono a ledere i reni;
 ed in considerazione della tendenza del
 morbo a determinare l'astenia ge-
 nerale e le complicanze renali si am-
 ministra a cucchiaia nelle 24 ore
 atter e serpentaria aa gram 4 - adonis
 vernalis gram 2 - f. infusa calda alla co-
 latura di gram 200 - acque aromatiche
 gram 100 - benzoato sodio gram 2 - aceta-
 to sodico gram 1,50 - liquore arisato
 di ammonio gram 30 - tintura di as-
 nia gram 15 - succo di bigoniu, di sal-
 golo e di a. kermes aa gram 15. all'ad

Durante i pasti
bisogna bere la

VICHY-CÉLESTINS

31 Sabato

s. QUINTINO

OTTOBRE

Memorandum

tea si sostituisce la poligola se vi sono fatti umidi bronchiali, e la tosse non è molto insistente; ma se la tosse è stizzosa e stanca gli infermi, si calma come sopra si è detto, con piccole e ripetute dosi di codeina/codeina centigr. 20 (f. c. 4 - una ogni tre ore).

Verso il terzo giorno, nei casi lievi, la febbre decresce, ed allora bastano le decozioni pettorali, e capsule di chinino e canfora/valerianato di chinino centigr. 20 canfora centigr. cinque, mattina e sera una oppure iniezione di chinino la mattina/gr. 0,50 e di canfora la sera.

In questi primi giorni, constatata la complicazione renale, è bene iniziare l'amministrazione della teobromina (gram. uno in due capsule, mattina e sera una) scartando senza altro tutti gli altri diuretici.

In quanto alla digitale nei casi di complicanze polmonari, essa è indicatissima quando solo vi sono i segni del polso digitale (piccolo, vuoto, frequente, aritmico) si preparano le preparazioni iniezzabili, e se vi è complicanza renale si associa la somministrazione della teobromina per correggere l'azione ipertensiva.

Per ricevere gratis e franco l'AGENDA 1904

mandare entro NOVEMBRE una Cartolina di richiesta al Signor

F. CASTELLI - PARIGI, 13, Rue de Bruxelles

1° Domenica

OGNISSANTI

NOVEMBRE

COMM. DEF.

Lunedì 2

Della digitale.

In riguardando alla terapia classica per mezzo del salasso, è da preferire il sanguisugio, perché il salasso, abbassando troppo rapidamente la pressione vasale, non dà tempo al cuore di adattarsi progressivamente. Mentre col sanguisugio si può sottrarre sangue dai territorii vasali inferiori che sembrano prevalentemente affetti dai veleni circolanti, così se prevalgono segni di meningismo, la sede di elezione del sanguisugio è la regione mastoidea o delle pinne nasali. Invece, prevalgono i segni d'indossicazione generale (vomito, singhiozzo ecc.), allora, se il cuore è chiaramente impegnato, si applica il sanguisugio sulle regioni carotidi. Se poi vi sono anche complicanze polmonari, se queste danno pensiero, nel senso di una intensa congestione delle vie respiratorie con ipertensione nel piccolo circolo, con notevole ansietà respiratoria, congestione del viso per difficoltà scarico delle giugulari ed altro, il sanguisugio si potrà applicare sul torace, preferibilmente verso le basi per avvicinarsi alla regione

PASTIGLIE PANERAJ

IL MIGLIOR RIMEDIO CONTRO LA TOSSE

3 Martedì S. SILVIA NOVEMBRE S. CARLO B. Mercoledì 4

ni epato-renal e spleno-renal. Doves-
 sendo i fatti congestivi in un lato, si vi-
 si erigere un sanguisugio più largo.
 Il numero delle mignolle da applicare
 va da 6 a 10 in un primo tempo, ed oc-
 correndo altra sottrazione di sangue
 dopo 30 a 40 ore si applicano altre 4
 o 5, seguita questa seconda sottrazio-
 ne da una piccola ipodermoclisi
 (non oltre i 20 c.c.) di siero fisiologico.
 In riguardo agli impausti caldo-umidi
 di sub. torace si potrà concedere l'appli-
 cazione, però per non più di venti
 minuti per volta, in modo di conservar-
 si sempre caldi, e ripetuti ogni 2 o
 4 ore. Si potranno usare senapi-
 zati, ricordando, però, che con re-
 so, bisogna astenersi dalle applicazio-
 ni senapali.
 In quanto alla dieta si potrà attenersi
 al latte, brodi con o senza uova.
 Costata però una lesione renale
 bisogna limitarsi alla dieta latte
 assoluta, escludendo le solite generaz-
 ion di alcoolici. Padula la febbre si può
 concedere il riso, la passata di patate, pesce
 bollito, mazzarella, carne di pollo, qual-
 che uovo, frutta cotta - il tutto con po-
 co sale.

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA TOSSE

5 Giovedì S. ZACCARIA NOVEMBRE S. LEONARDO Venerdì 6

macchie di ruggine
 Per togliere le macchie di ruggine sul pannello in
 chiaro, dopo averlo lavato, si fa un vapore di acqua
 con acido ossalico finemente polverizzato e si
 immerge il ferro in una soluzione acida per
 lungo, facendo sviluppare idrogeno nascente
 con l'immersione nel liquido un pezzo di zinco.

macchie di inchiostro
 Si pratica la lavatura con la soluzione
 seguente, e l'ultima traccia si toglie con
 una spatola.

*N.B. L'acido ossalico si presta meglio sciolto
 in alcool, e più se si aggiunge acido acetico.
 Tale miscela si applica con la macchia di erba*

P) - Le macchie.

Macchie di ruggine sulla biancheria. — Mentre si dà all'oggetto il sapone per lavarlo, si fa scaldare un ferro; si pone sul ferro caldo un pannolino bagnato, affinché si sviluppi un vapor d'acqua; si colloca sopra il pannolino fumante la parte macchiata di ruggine, e col dito si prende dell'acido ossalico, o del sale d'acetosa in polvere, cospargendole in più volte sulla macchia. Il calore e l'umidità acceferano l'azione dell'acido sulla ruggine, e sparisce tosto la macchia. Ciò ottenuto si torna e dare il sapone.

RICETTE CASALINGHE.

Lavatura delle stoffe di seta. — Qualunque sia il procedimento che s'impiega per pulire delle stoffe di seta, bisogna evitare di torcere e spiegazzare la stoffa nelle mani, durante le immersioni nell'acqua, e non servirsi che di una spazzola assai morbida, per togliere, coll'acqua tiepida prima, il sudiciume che aderisce al tessuto. La lavatura all'acqua di patate che raccomandiamo, ha il vantaggio di convenire ugualmente alle stoffe di cotone e di lana e non altera affatto le stoffe cosiddette indiennes. Stemperate perciò 125 grammi di fecola di patate in mezzo litro d'acqua, fate riscaldare a fuoco lento, rimettendo sempre fino a consistenza della pasta liquida. Fate sciogliere la gelatina che ne risulta, in dieci litri d'acqua tiepida e servitene per insaponare il tessuto che sciacquerete poscia all'acqua fredda. Con questo procedimento vedrete che la tinta ed i colori primitivi della stoffa riprenderanno il loro splendore.

Mezzo di rendere abitabile una casa nuova. — Bruciate a brevi intervalli due o tre volte del carbonio di legno in ogni locale ben chiuso. Durante la combustione il carbonio si combina coll'ossigeno dell'aria e forma dell'acido carbonico che è assorbito dalla calce dei muri e li fa asciugare più rapidamente. Dopo di ciò aprite per stabilire una forte corrente d'aria e poco dopo i locali saranno abitabili senza alcun pericolo.

Punture di tarlo sui mobili antichi. — Si può arrestare la distruzione dei mobili per effetto del tarlo, iniettando con una siringa di Pravaz del solfuro di carbonio nei buchi dei tarli, turando poi con della cera.

Una buona colla per le porcellane. — Fate sciogliere della colla di pesce nello spirito di vino. Tenetela in una bottiglia ben turata e con questo prodotto potrete incollare la porcellana, la maiolica, ecc.

ESTRATTO PANERAJ

IL MIGLIOR PREPARATO
DI **CATRAME**

7 Sabato s. ERNESTO AB. NOVEMBRE s. GOFFREDO Domenica 8

Per conservare gli oggetti di gemma
si introducono per pochi istanti nella
paraffina liquida, lasciandoli poi scog-
liolare per un'ora in una stufa a 100°.

Da immergere gli oggetti di gemma in
acqua saponata col 5% di glicerina
oppure lavarli con acqua ammo-
niacale per evitarli il contatto con grassi.

FEGATO
Apparecchio biliario

VICHY-GRANDE-GRILLE

11 Venerdì S. DAMASO DICEMBRE S. VALERIO Sabato 12

III. Un versamento torbido, perché cristallo, che deve la sua torbidezza non a pus sospeso, ma a presenza di finissime particelle di grasso, si erompe come un versamento sieroso limpido.

IV. Se la voce si trasmette netta in tutte le lettere, ma fiavole e lontana, il versamento è limpido, ma è ricchissimo di fibrinogeno.

V. Se la voce si trasmette netta in tutte le lettere, vicina, ma per zone si dimostra ora più fiavole ed ora più intensa, il versamento è limpido, ma esistono zone cotennose pleuriche o mite e polpore.

VI. Se la voce si trasmette morca di alcune lettere ed in generale con sillabazione fusa e confusa, il versamento è in grado vario corpuscolato.

VII. Se la voce non si trasmette affatto, o solo come «pulsio labiale», il versamento è densamente corpuscolato (pus o sangue).

PASTIGLIE PANERAJ

CONTRO LA TOSSE

9 Mercoledì S. SIRO V. DICEMBRE S. CASA DI LOR. Giovedì 10

Fenomeno del Gascelli nella pleurite essu-
 dativa per diagnosticare la natura dell'essudato.
 Si ascolti in basso nella metà del torace affetto fra
 l'ascellare anteriore e posteriore, oppure anche
 anteriormente la trasmissione della voce afo-
 na, e si ha che la parola scintilla passa attra-
 verso alle seguenti riduzioni caratteristiche:

1. pre-ta-tre

2. ten-ta-te

3. en-a-e

4. e-a-e

5. semplice appulse labiale

6. silenzio completo

onde si possono dedurre sulla natura dei ver-
 samenti i seguenti sette corollari:

1. Ogni qual volta avviene che in un ver-
 samento, precedentemente diagnosticato come to-
 se, e su tutta la sua estensione, in alto ed in
 basso, la voce afoana si trasmette con distin-
te lettere sillabate, con intensità aumenta-
ta e con carattere di vicinanza all'orecchio
 di chi ascolta, il versamento è con sicurezza
 sieroso, non corpuscolato e di poca densità.

Il se la voce si trasmette con questi caratteri
 solo in alto del versamento, mentre in basso
 la voce afoana si affievolisce e si va perdendo
 più o meno la progressiva nettezza delle ver-
sere, il versamento è corpuscolato ed in via di
 sedimentazione per gravità.

FERRO PAGLIARI

ASSIMILABILE
INALTERABILE

5 Sabato S. DALMAZZO DICEMBRE S. NICOLÒ Domenica 6

Cognizioni utili per quando si prescrive il calomelano per bocca

- 1.° non perdere di vista la sua composizione chimica e ricordarsi che è un proto cloruro di mercurio (si praticano gli auzi);
- 2.° Evitare di ordinare il calomelano a individui colpiti o sospetti di aver colpito le lesioni renali. Onde è prudente rinunziare all'uso di tale rimedio in individui oltre la cinquantina, nei quali i reni, in generale, lasciano qualcosa da desiderare;
- 3.° Avanti di somministrare il calomelano esaminare bene le condizioni della dentatura del malato ed ove quelle fossero cattive, se esistesse gengivite o i denti fossero coperti da tartaro, ricorrere ad altri purganti;

È bene aver l'abitudine di raccomandare ai malati cui si ordina il calomelano di fare una tavoletta preventiva della bocca con glicerina al peruviano, la di potassa 1/20, o al timolo o con polvere antifriica alcolica: a questa ultima bisogna è indicata la seguente miscela.

clorato potassico gram. venti
borato sodico e magnesia calcinata per an. aa. gram. quarant
mentolo gram. uno
uso: uso interno.

RENI
VESCICA

VICHY-CÉLESTINS

13 Venerdì s. OMOBONO NOVEMBRE s. VENERANDA Sabato 14

Bisinfusione delle ferite e loro cura

*1° si lava la ferita con soluzione di
sublimato in soluzione acquosa 1/90
a parti uguali con alcool Fenolo
colorato si disinfetta ove è il caso, e poi
si imbeve ogni ferita con alcool
iodato 5% e si copre con garza e
catene*